



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 19
18/07/2014

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

I DATI DEL MONITORAGGIO SUL TERRITORIO CON TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI INDICANO CHE E' INIZIATA LA FASE DI OVIDEPOSIZIONE DELLA TERZA GENERAZIONE: SI CONSIGLIA PERTANTO DI UTILIZZARE PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA, A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, GLADIATOR, PRODIGY)
(MASSIMO 4 INTERVENTI) T.C. 7 GG

OPPURE

THIOACLOPRID (CALYPSO) (MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO)
(PRODOTTI ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA) T.C. 14 GG

IN ALTERNATIVA IMPIEGARE SUCCESSIVAMENTE PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (2 INT./ANNO) T.C. 15 GG
OPPURE

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C 7 GG
OPPURE

SPINOSAD (LASER) (MASSIMO 3 INT./ANNO) T.C 7 GG
OPPURE

INDOXACARB (STEWART) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG
OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

VISTA LA FASE DI SVILUPPO DELL'INSETTO (LARVALE II GENERAZIONE), IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

CLOPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (2 INT./ANNO) T.C. 15 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG

TICCHIOLATURA

PER GLI IMPIANTI COLPITI SI CONSIGLIA DI CONTINUARE LA COPERTURA SOLO IN PREVISIONE DI PIOGGIA, CON PRODOTTI A BASE DI:

DITHIANON (750 G./HA) (DELAN 70WG) T.C. 21 GG

OPPURE

DODINA (VARI) (MASSIMO 4 TRATTAMENTI/ANNO) T.C. 40 GG.

OPPURE

FLUAZINAM (OHAYO, BANJO) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO) T.C. 60GG

SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

VISTO LO SVILUPPO DELL'INSETTO IN BASE AL MONITORAGGIO (FASE LARVALE II GEN.) ED AI MODELLI PREVISIONALI, IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV/ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MAX TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (MAX TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

SPINOSAD (LASER) (MAX TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (PRE-RACCOLTA)

MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG. (VERIFICARE N° MAX DI TRATTAMENTI RIPORTATI IN ETICHETTA DEI SINGOLI FORMULATI)

OPPURE

CIPROCONAZOLO (GALEO, ETC..) T.C.3 GG.

OPPURE

PROPICONAZOLO (OPINION, ETC..) T.C.14 GG.

(IBE: MAX 4 INT./ANNO SU PESCO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) T.C.7 GG. (14 GG. PER ALBICOCCO) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (ARAGON-CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 3 INTERVENTI/ANNO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T O T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

