



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 20
23/07/2014

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI AD AZIONE
LARVICIDA A BASE DI:

CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (2 INT./ANNO) T.C. 15 GG

OPPURE

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C 7 GG

OPPURE

SPINOSAD (LASER) (MASSIMO 3 INT./ANNO) T.C 7 GG

OPPURE

INDOXACARB (STEWART) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG

OPPURE

BACILLUS THURINGENSIS (VARI) T.C. 3 GG

OIDIO

VISTA LA PRESENZA DI ATTACCHI SU FOGLIA PER LE CONDIZIONI METEO
PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DEL PATOGENO, SI
CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI SPECIFICI A BASE DI:

QUINOXIFEN* (ARIUS) (*MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO) T.C 14 GG

**QUINOXIFEN*+MICLOBUTANIL(ARIUS SYSTEM PLUS)(CON IBE MAX
4 TRATTAMENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ)T.C 14 GG**

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD) T.C. 14 GG

OPPURE

ZOLFO BAGNABILE (VARI) T.C. 5 GG





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI OLTRE LA SOGLIA (PRESENZA DI FRUTTI BACATI FRESCI SUPERIORE ALL'1%), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (2 INT./ANNO) T.C. 15 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG

OPPURE

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)(AL MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

SPINOSAD (LASER) (MAX TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

TICCHIOLATURA

PER GLI IMPIANTI COLPITI SI CONSIGLIA DI CONTINUARE LA COPERTURA **SOLO IN PREVISIONE DI PIOGGIA** (VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE)

SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

VISTO LO SVILUPPO DELL'INSETTO IN BASE AL MONITORAGGIO (FASE LARVALE II GEN.) ED AI MODELLI PREVISIONALI, IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV/ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MAX TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (MAX TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

SPINOSAD (LASER) (MAX TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (PRE-RACCOLTA)

MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG. (VERIFICARE N° MAX DI TRATTAMENTI RIPORTATI IN ETICHETTA DEI SINGOLI FORMULATI)

OPPURE

CIPROCONAZOLO (GALEO, ETC..) T.C.3 GG.

OPPURE

PROPICONAZOLO (OPINION, ETC..) T.C.14 GG.

(IBE: MAX 4 INT./ANNO SU PESCO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) T.C.7 GG. (14 GG. PER ALBICOCCO) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (ARAGON-CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 3 INTERVENTI/ANNO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T O T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

