



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 22
27/08/2014

PESCO (FINE RACCOLTA)

CANCRI RAMEALI

NEI PESCHETI A RISCHIO PERCHÉ COLPITI DA GRANDINATE O PER PRESENZA DI CANCRI RAMEALI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

TIOFANATE METIL (MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO IN PRE-FIORITURA E POST-RACCOLTA, SU AUTORIZZAZIONE DEL TECNICO)

BATTERIOSI DA XANTHOMONAS

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE NELLA FASE COMPRESA TRA POST-RACCOLTA E CADUTA FOGLIE, UN TRATTAMENTO CON PRODOTTI A BASE DI:

RAME (DOSE: 20 GR/HL DI RAME METALLO)

ALBICOCCO (POST RACCOLTA)

BATTERIOSI

VEDERE LE INDICAZIONI PRECEDENTI PER IL PESCO





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (MATURAZIONE)

CARPOCAPSA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI OLTRE LA SOGLIA (PRESENZA DI FRUTTI BACATI FRESCHI SUPERIORE ALL'1%), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (2 INT./ANNO) T.C. 15 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG

OPPURE

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)(AL MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

SPINOSAD (LASER) (MAX TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

TICCHIOLATURA E MARCIUMI DA CONSERVAZIONE

VISTE LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE PARTICOLARMENTE PREDISPOSTE LO SVILUPPO DI MARCIUMI IN FASE DI CONSERVAZIONE, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

CAPTANO (AL MASSIMO 5 INT./ANNO, CON **DEROGA REGIONALE**) T.C. 21 GG

OPPURE

BOSCALID + PYRACLOSTRBIN(AL MASSIMO 3 INT./ANNO) T.C. 7 GG

OPPURE

RAMEICI T.C.: VEDI ETICHETTA

SUSINO (PRE-RACCOLTA)

CYDIA FUNEBRANA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV/ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MAX TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (MAX TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

SPINOSAD (LASER) (MAX TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

SUSINO (PRE-RACCOLTA)

MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG. (VERIFICARE N° MAX DI TRATTAMENTI RIPORTATI IN ETICHETTA DEI SINGOLI FORMULATI)

OPPURE

CIPROCONAZOLO (GALEO, ETC..) T.C.3 GG.

OPPURE

PROPICONAZOLO (OPINION, ETC..) T.C.14 GG.

(IBE: MAX 4 INT./ANNO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) T.C.14 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (ARAGON-CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T O T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

