


Previsione dell'andamento dello sviluppo di diabrotica: situazione al 17 luglio 2013



Commento

Dal grafico si può notare che probabilmente in tutte le stazioni verso l'inizio-metà della prossima settimana si avrà l'emergenza del 50 % degli adulti di diabrotica e quindi potranno incominciare le ovideposizioni tenuto conto anche del fatto che sono state riscontrate le prime femmine gravide; perciò deve essere valutata l'eventualità di effettuare i trattamenti insetticidi contro gli adulti, tenendo conto, nei campi dove è stato eseguito il monitoraggio, delle catture riscontrate sulle trappole (si ricorda che la soglia è di 50 catture/ trappola dopo le prime due settimane di monitoraggio).

Dai dati in nostro possesso le catture risultano al di sotto della soglia pertanto **in generale si sconsigliano interventi insetticidi** così come negli appezzamenti che non ospiteranno più mais l'anno prossimo. Qualora invece il monitoraggio specificasse un livello di popolazione più alto e si decidesse quindi di effettuare un trattamento sarà importante valutare bene anche tutti i parametri tecnici (volume

d'acqua, dose di prodotto, ecc.) al fine di massimizzare la sua efficacia e se si è a conoscenza di alveari nelle vicinanze è buona norma avvisare gli apicoltori dell'intenzione di trattare, valutando inoltre la fase fenologica della coltura in quanto si ricorda che è **vietato il trattamento in fioritura**.