



Diabrotica del mais - Andamento della catture degli adulti

Situazione al 6 luglio 2011


Andamento delle catture di adulti di diabrotica 2011 (provincia di TORINO, comuni dal 1° al 28°)




Andamento delle catture di adulti di diabrotica 2011 (provincia di TORINO, comuni dal 29° al 56°)




Andamento delle catture di adulti di diabrotica 2011 (provincia di CUNEO)




Andamento delle catture di adulti di diabrotica 2011 (provincia di ASTI)




Andamento delle catture di adulti di diabrotica 2011 (provincia di NOVARA)



Andamento delle catture di adulti di diabrotica 2011 (provincia di VERCELLI)



Andamento delle catture di adulti di diabrotica 2011 (provincia di ALESSANDRIA)


Legenda

Sull'asse delle ascisse sono indicati i comuni in cui sono state posizionate le trappole cromotropiche per il monitoraggio degli adulti di diabrotica; in quello delle ordinate la media delle catture delle tre trappole di ogni stazione.

Commento

Dai grafici delle catture della terza settimana di monitoraggio è possibile osservare come in tutte le postazioni dove la settimana scorsa si è raggiunta e superata la soglia dei 50 individui/settimana il numero delle catture sia in diminuzione. Unica eccezione è rappresentata dalle trappole posizionate nel comune di Rivalta di Torino dove il numero di adulti di diabrotica rilevato è in lieve aumento (da 101 della scorsa settimana a 117).

Tale situazione evidenzia come mediamente su tutto il territorio regionale sta per essere oltrepassato il picco del volo degli adulti dell'insetto.

Tra le stazioni di monitoraggio che nei primi 14 giorni sono rimaste al di sotto della soglia di intervento ve ne sono diverse in cui durante la recente settimana si è verificato un significativo incremento delle catture. In particolar modo ciò è accaduto nelle postazioni dei comuni di Cercenasco, Cambiano, Favria, Foglizzo, Pinerolo, Piossasco, Piverone e Rivarolo nella provincia di Torino, Fontaneto d'Agogna, Marano Ticino e Sizzano in quella di Novara e Felizzano e Quargnento nella provincia di Alessandria. Però, nonostante l'incremento di catture appena descritto coinvolga più comuni di tre province le uniche postazioni che a nostro parere occorre tenere in considerazione nelle prossime settimane sono solo quelle ubicate presso i comuni di Piossasco, Pinerolo e Felizzano in quanto solo lì il numero di adulti medio per postazione degli ultimi 7 giorni è elevato (rispettivamente pari a 100, 91 e 114 unità).

Per quanto riguarda invece le province di Asti, Cuneo e Vercelli, dall'ultima settimana di rilievi emergerebbe come non vi siano stazioni in cui il numero di diabrotiche possa essere tale da provocare danni agli appezzamenti di mais monitorati anche se questo, soprattutto nella provincia di Cuneo, sembra essere in contrasto con le molte segnalazioni di danni (allettamenti, rosure delle sete fiorali e delle foglie) comunicateci dai tecnici delle organizzazioni.

Ricordiamo che qualora si decidesse di effettuare un trattamento adulticida ancora in questa settimana, l'efficacia negli appezzamenti in cui il picco del volo degli adulti è già avvenuto potrebbe non essere ottimale. Rammentiamo nuovamente che **è vietato il trattamento se la coltura da trattare è in fase di fioritura**; inoltre se si è a conoscenza della presenza di alveari nelle vicinanze è buona norma avvisare gli apicoltori dell'intenzione di eseguire il trattamento.