


## Previsione dell'andamento dello sviluppo di diabrotica: situazione al 12 luglio 2012



### Commento

Innanzitutto si precisa che i dati delle stazioni con gli istogrammi che risultano tratteggiati (ossia le località di Asti, Borgovercelli, Fossano, Mondovì e Racconigi) riportano dati non reali ma stimati perché tali stazioni sono state oscurate per interruzione del Servizio. Dal grafico si può notare che in tutte le località mediamente il volo di diabrotica è tra il 70-80% con una presenza significativa di femmine gravide e pertanto gli eventuali trattamenti insetticidi,

soprattutto se eseguiti nella prossima settimana, risulteranno più indirizzati contro la piralide e solo in parte nei confronti della diabrotica stessa; in tal caso si consiglia di iniziare negli appezzamenti in cui si è verificata la presenza di entrambe le avversità. Fanno eccezione le località più fresche come Mondovì e Suno in cui gli eventuali interventi risultano ancora validi contro la diabrotica. Comunque qualora si decidesse di effettuare un trattamento sarà importante valutare bene anche tutti i parametri tecnici (volume d'acqua, dose di prodotto, ecc.) al fine di massimizzare la sua efficacia e se si è a conoscenza di alveari nelle vicinanze è buona norma avvisare gli apicoltori dell'intenzione di trattare, valutando inoltre la fase fenologica della coltura in quanto si ricorda che **è vietato il trattamento in fioritura.**