



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

**BOLLETTINO N° 18**

**25/07/2012**

**PESCO  
(INGROSSAMENTO FRUTTI)**

### **CYDIA MOLESTA**

I MONITORAGGI ATTRAVERSO LE TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI CONFERMANO L'AUMENTO DI CATTURE REGISTRATO PRECEDENTEMENTE. PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** (VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE) SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE AL PIÙ PRESTO, ALTRIMENTI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE LA PROSSIMA SETTIMANA CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

**CLOPPIRIFOS METILE** (RELDAN 22, ETC.) (2 INT./ANNO) T.C. 15 GG

OPPURE

**EMAMECTINA BENZOATO** (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 7 GG

OPPURE

**FOSMET** (SPADA) (2 INT./ANNO) T.C. 28 GG

(I PRODOTTI INDICATI SONO ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)

### **PESCO-SUSINO (PRE-RACCOLTA)**

#### **MONILIA**

VISTE LE CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA È POSSIBILE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AL LORO TEMPO DI CARENZA, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FENBUCONAZOLO** (SIMITAR 5 EW, INDAR) T.C. 3 GG.

**TEBUCONAZOLO** (FOLICUR) T.C. 7 GG.

(CON IBE MASSIMO 4 INT./ANNO)

**FENEXAMIDE** (TELDOR) T.C. 3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

**BOSCALID** (CANTUS) T.C. 3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### CARPOCAPSA

SI CONSIGLIA DI PROSEGUIRE I MONITORAGGI: IN SITUAZIONI OLTRE LA SOGLIA (PRESENZA DI FRUTTI BACATI FRESCHI SUPERIORE ALL'1%), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

**CLORPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX) (AL MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 30 GG**

OPPURE

**CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.)(3 INT./ANNO) T.C. 15 GG**

OPPURE

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)(AL MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 7 GG.**

OPPURE

**FOSMET (SPADA) (MASSIMO 3 INT./ANNO) T.C 14 GG.**

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASIDI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

