



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 01
07/03/2012

PESCO (GEMMA RIGONFIA)

BOLLA-CORINEO

PER LE AZIENDE CHE NON SONO ANCORA INTERVENUTE, SI RICORDA CHE È ANCORA POSSIBILE IN QUESTO PERIODO RINNOVARE LA COPERTURA CON PRODOTTI A BASE DI

ZIRAM (VARI) (LIMITAZIONE DI 3 KG/HA AD ECCEZIONE DEL F.C. TRISCABOL) OPPURE **TIRAM** (POMARSOL 50WG) (IN ALTERNATIVA TRA LORO E SONO *PREVISTI SOLO 2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI CON QUESTI PRODOTTI*).

OPPURE

DODINA (VARI)

OPPURE

DITIANON (DELAN WG)

L'INTERVENTO RISULTA MOLTO IMPORTANTE NEGLI IMPIANTI COLPITI IN FORMA GRAVE LO SCORSO ANNO A COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO EFFETTUATO NELL'AUTUNNO SCORSO.

COCCINIGLIA

E' POSSIBILE INTERVENIRE IN SITUAZIONI DI FORTE INFESTAZIONE, ENTRO LA FASE DI GEMMA RIGONFIA, CON PRODOTTI A BASE DI:
OLIO BIANCO (VARI) IN DOSI DI 1,5-2 KG/HL





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO (ROTTURA GEMMA)

MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN PRE-FIORITURA CON PRODOTTI A BASE DI:

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) OPPURE
CYPRODINIL (CHORUS) (MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO
INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSAITA')**

MELO (INGROSSAMENTO GEMME)

ANTONOMO

NEGLI IMPIANTI A RISCHIO (ZONE COLLINARI VICINO AI BOSCHI) E NEI FRUTTETI IN CUI LO SCORSO ANNO SI SONO VERIFICATI DEI DANNI SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE I MONITORAGGI ED EVENTUALMENTE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FOSMET (SPADA)

CANCRI RAMEALI

IN QUESTA FASE FENOLOGICA E' CONSIGLIATO EFFETTUARE UN TRATTAMENTO SPECIFICO CON PRODOTTI A BASE DI:

RAME (VARI)

SI CONSIGLIA INOLTRE DI RIMUOVERE I RAMI DEPERITI IN FASE DI POTATURA





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO GEMME)

COCCINIGLIA

IL TRATTAMENTO E' CONSIGLIATO SE NON SONO STATI EFFETTUATI TRATTAMENTI SPECIFICI NELL'AUTUNNO PRECEDENTE ED IN PARTICOLARE SE SI E' RISCONTRATA LA PRESENZA DEGLI SCUDETTI SUL LEGNO DI POTATURA.

OLIO BIANCO (VARI)
OLIO BIANCO + ZOLFO (POLITHIOL)
PROTEINATO DI ZOLFO (SULFAR)

IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:
POLISOLFURO DI CALCIO

(I POLISOLFURI SONO INCOMPATIBILI CON I PRODOTTI RAMEICI, PER CUI NEL CASO DEL LORO IMPIEGO OCCORRE RISPETTARE UN NOTEVOLE INTERVALLO DI TEMPO TRA I DUE INTERVENTI).

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.
- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

