

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 01
14/03/2011

PESCO (GEMMA RIGONFIA)

BOLLA-CORINEO

PER LE AZIENDE CHE NON SONO ANCORA INTERVENUTE, SI RICORDA CHE PER PREVENIRE EVENTUALI ATTACCHI DI BOLLA È ANCORA POSSIBILE IN QUESTO PERIODO RINNOVARE LA COPERTURA CON PRODOTTI A BASE DI

ZIRAM (VARI)/TIRAM (POMARSOL 50WG) (IN ALTERNATIVA TRA LORO E SONO *PREVISTI SOLO 2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI CON QUESTI PRODOTTI*).

OPPURE

DODINA (VARI)

OPPURE

DITIANON (DELAN WG)

L'INTERVENTO RISULTA MOLTO IMPORTANTE NEGLI IMPIANTI COLPITI IN FORMA GRAVE LO SCORSO ANNO A COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO EFFETTUATO NELL'AUTUNNO SCORSO.

COCCINIGLIA

E' POSSIBILE INTERVENIRE IN SITUAZIONI DI FORTE INFESTAZIONE, ENTRO LA FASE DI GEMMA RIGONFIA, CON PRODOTTI A BASE DI:

OLIO BIANCO (VARI) IN DOSI DI 1,5-2 KG/HL OPPURE

OLIO BIANCO + ZOLFO (POLITHIOL)

ALBICOCCO (PRE FIORITURA)

MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) (MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

CON IL CONTRIBUTO DELLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

MELO (INGROSSAMENTO GEMME)

ANTONOMO

NEGLI IMPIANTI A RISCHIO (ZONE COLLINARI VICINO AI BOSCHI) E NEI FRUTTETI IN CUI LO SCORSO ANNO SI SONO VERIFICATI DEI DANNI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FOSMET (SPADA)

COCCINIGLIA

NEI FRUTTETI IN CUI SI È OSSERVATA LA PRESENZA DEGLI SCUDETTI SUL LEGNO DI POTATURA, È POSSIBILE INTERVENIRE IN QUESTO PERIODO CON PRODOTTI A BASE DI

POLISOLFURO DI CALCIO

(I POLISOLFURI SONO INCOMPATIBILI CON I PRODOTTI RAMEICI, PER CUI NEL CASO DEL LORO IMPIEGO OCCORRE RISPETTARE UN NOTEVOLE INTERVALLO DI TEMPO TRA I DUE INTERVENTI).

IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

OLIO BIANCO (VARI)

OLIO BIANCO + ZOLFO (POLITHIOL)

PROTEINATO DI ZOLFO (SULFAR)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

CON IL CONTRIBUTO DELLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA