



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 10

DATA 17/05/2011

MELO

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO ATTRAVERSO LE TRAPPOLE A FEROMONI CONTINUA A SEGNALARE LA PRESENZA DI ADULTI: PER LE AZIENDE CHE NON HANNO ANCORA EFFETTUATO IL TRATTAMENTO OVO-LARVICIDA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

CLORPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX)

OPPURE

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)(AL MASSIMO 2 INT./ANNO)

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO)

TICCHIOLATURA

A SEGUITO DELLE LE PRECIPITAZIONI AVVENUTE NELLE ULTIME ORE, NEI FRUTTETI IN CUI NON È STATA ADOTTATA UNA DIFESA PREVENTIVA CONTRO TALE AVVERSITÀ, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI IBE A BASE DI:

**MICLOBUTANIL, FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO,
DIFENOCONAZOLO, BITERTANOLO, PENCONAZOLO,
TETRACONAZOLO.**

IN MISCELA CON I PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI

MANCOZEB (DITHANE DG/M-45)

DITHIANON (DELAN WG)





Coldiretti Alessandria



MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

OIDIO

SI SEGNA LA PRESENZA DI INFEZIONI IN ATTO: NEI MELETI A RISCHIO D'INFEZIONE, VISTE LE CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, SI CONSIGLIA DI AGGIUNGERE ALL'INSETTICIDA UN PRODOTTO SPECIFICO ANTOIDICO A BASE DI:

QUINOXIFEN (ARIUS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

ZOLFO (VARI)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

(SI RICORDA CHE I PRODOTTI IBE ANTI-TICCHIOLATURA HANNO ANCHE EFFICACIA ANTOIDICA)

BUTTERATURA AMARA

NEI MELETI E NELLE VARIETA' SENSIBILI, CHE SOLITAMENTE PRESENTANO TALE FISIOPATIA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:
CLORURO/OSSIDO DI CALCIO

CILIEGIO (INVAIATURA)

MONILIA

IN CASO DI PIOGGIA O ELEVATA UMIDITÀ, SI RICORDA CHE SI PUO' INTERVENIRE ANCHE IN PRE-RACCOLTA, A SECONDA DEI TEMPI DI CARENZA CON:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR) T.C. 7GG.

OPPURE

BITERTANOLO (PROCLAIM) T.C. 21 GG.

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C. 7 GG.

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C. 3 GG.

TALI FUNGICIDI NON SONO UTILIZZABILI PIÙ DI 2 VOLTE ALL'ANNO.





Coldiretti Alessandria



PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA

IL MONITORAGGIO ATTRAVERSO LE TRAPPOLE A FEROMONI CONTINUA A SEGNALARE LA PRESENZA DI ADULTI, ANCHE SE IN CALO RISPETTO ALLA SETTIMANA SCORSA: PER LE AZIENDE CHE NON HANNO ANCORA EFFETTUATO IL TRATTAMENTO OVO-LARVICIDA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

CLORPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX)

OPPURE

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)(AL MASSIMO 2 INT./ANNO)

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO)

OIDIO

VISTA LA PRESENZA DI INFEZIONI, SI RICORDA, QUALORA NON SIA ANCORA STATO EFFETTUATO, DI FARE UN TRATTAMENTO ANTIOIDICO, AGGIUNGENDO ALL'INSETTICIDA UN PRODOTTO SPECIFICO.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.
- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68).

