



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 11

22/05/2012

MELO

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

IL PERDURARE DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE INSTABILI IMPONE DI MANTENERE ALTA LA MASSIMA ATTENZIONE VERSO LO SVILUPPO ED IL CONTENIMENTO DELLE INFEZIONI.

IN CASO DI INTERVENTI SUCCESSIVI ALLE PIOGGE, SI RICORDA CHE È POSSIBILE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE CON **PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA**

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(MICLOBUTANIL, FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO) IN MISCELA CON I PRODOTTI DI COPERTURA:

***DITHIANON** (DELAN WG, KUKI WG, TIANON WG)*

OPPURE

***PROPINEB** (ANTRACOL 70 WG) (MASSIMO 2 TRATTAMENTI/ANNO)*

CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO TRAMITE LE TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI SEGNALANO LA PRESENZA DI ADULTI NELLA FASE DI MASSIMO SVILUPPO, LA PRESENZA DI UOVA E L'INIZIO DELLA FASE LARVALE: PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO, SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE APPENA POSSIBILE CON FORMULATI AD AZIONE

OVO-LARVICIDA A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, PRODIGY) (MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

TEBUFENOZIDE (MIMIC)

(MASSIMO 4 INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

CONTINUA IL MONITORAGGIO ATTRAVERSO LE TRAPPOLE A FEROMONI, IL CONTROLLO VISIVO SULLA VEGETAZIONE ED I MODELLI PREVISIONALI: IN BASE ALLO SVILUPPO DELLA PRESENZA DI ADULTI (IN FASE CALANTE), SIAMO NELLA FASE FINALE DELLA PRIMA GENERAZIONE PER CUI SI CONSIGLIA DI ATTENDERE LE INDICAZIONI DEI PROSSIMI BOLLETTINI.

CILIEGIO-ALBICOCCO (PRE-RACCOLTA)

MONILIA

IN SITUAZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA È POSSIBILE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AL LORO TEMPO DI CARENZA, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.

(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO SU ALBICOCCO E 2 INT./ANNO SU CILIEGIO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASIDI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

