



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 13

05/06/2012

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

I MONITORAGGI ATTRAVERSO LE TRAPPOLE A FEROMONI, INDICANO UNA RIPRESA DEL VOLO E QUINDI L'INIZIO DELLA II GENERAZIONE. SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE VERSO LA FINE DELLA CORRENTE SETTIMANA CON PRODOTTI A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, PRODIGY) (MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE

TIACLOPRID (CALIPSO) (AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO)

(I PRODOTTI INDICATI SONO ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)

PERO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

PSILLA

NEI FRUTTETI CON PRESENZA DI MELATA SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON:

ABAMECTINA (VERTIMEC) IN MISCELA CON OLIO MINERALE (0,25%)

OPPURE

SPIROTETRAMAT (MOVENTO 48 SC)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

VISTA LA PREVISIONE DI PIOGGIA PER IL FINE SETTIMANA, E LA PRESENZA DI INFEZIONI IN ATTO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE, **CON I PRODOTTI DI COPERTURA:**

DITHIANON (*DELAN WG, KUKI WG, TIANON WG*)

OPPURE

FLUAZINAM (OHAYO) (T.C. 60 GG.)

AFIDE VERDE

SOLAMENTE IN PRESENZA DI ATTACCHI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLONICAMID (TEPPEKI)

OPPURE

PIRIMICARB (PIRIMOR 17,5)

CARPOCAPSA

I MONITORAGGI ED I MODELLI PREVISIONALI INDICANO CHE SIAMO NELLA **FASE LARVALE DELLA PRIMA GENERAZIONE: PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO**, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE AL PIÙ PRESTO CON FORMULATI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

CLORPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX) (AL MASSIMO 2 INT./ANNO)

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA

STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T O T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

