



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 14

12/06/2012

PESCO
(INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

I MONITORAGGI ATTRAVERSO LE TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI CONFERMANO LO STADIO DI II GENERAZIONE E L'INIZIO DELLA FASE LARVALE NELLE ZONE ANTICIPATE. PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** (VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE) SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE AL PIÙ PRESTO, ALTRIMENTI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE LA PROSSIMA SETTIMANA CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (2 INT./ANNO) T.C. 15 GG
OPPURE

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 7 GG
OPPURE

FOSMET (SPADA) (2 INT./ANNO) T.C. 28 GG

(I PRODOTTI INDICATI SONO ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)

SUSINO
(INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

LE TRAPPOLE A FEROMONI SEGNALANO LA PRESENZA DI ADULTI DI II GENERAZIONE: NEI FRUTTETI CON PRESENZA DELL'INSETTO SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ENTRO LA SETTIMANA CON PRODOTTI A BASE DI:

CLOTRANILIPROLE (CORAGEN) (2 INTERVENTI) T.C. 14 GG.
OPPURE

TIACLOPRID (CALIPSO) (UN INTERVENTO/ANNO) T.C. 14 GG.

OPPURE AD **INIZIO DELLA PROSSIMA SETTIMANA** CON PRODOTTI A BASE DI:

FOSMET (SPADA) (TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO-PESCO (PRE-RACCOLTA)

MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA È POSSIBILE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AL LORO TEMPO DI CARENZA, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR) T.C.7 GG.(3 GG. SU PESCO)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.

(CON IBE MASSIMO 4 INT./ANNO SU PESCO, 3 INT./ANNO SU ALBICOCCO E 2 INT./ANNO SU CILIEGIO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

MELO

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

NEI FRUTTETI CHE SI TROVANO IN ASSENZA DI MACCHIE, SI POSSONO SOSPENDERE GLI INTERVENTI ANTI-TICCHIOLATURA.

NEI FRUTTETI, INVECE, CON INFEZIONI DI TICCHIOLATURA IN ATTO ED IN CASO DI PREVISIONE DI PIOGGIA O BAGNATURE FOGLIARI, SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON **PRODOTTI A BASE DI:**

DITHIANON (DELAN WG, KUKI WG, TIANON WG) T.C. 30 GG

OPPURE

FLUAZINAM (OHAYO) T.C. 60 GG.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

I MONITORAGGI ED I MODELLI PREVISIONALI INDICANO CHE SIAMO NELLA **FASE LARVALE DELLA PRIMA GENERAZIONE**: SI CONSIGLIA DI ATTENDERE PROSSIME INDICAZIONI OPPURE DI CONSULTARE IL BOLLETTINO PRECEDENTE

OIDIO

SI SEGNA LA PRESENZA DI INFEZIONI IN ATTO: NEI MELETI A RISCHIO D'INFEZIONE, VISTE LE CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, SI CONSIGLIA DI AGGIUNGERE UN PRODOTTO SPECIFICO ANTIOIDICO A BASE DI:

QUINOXIFEN (ARIUS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO) T.C 14 GG
OPPURE

ZOLFO (VARI) T.C. 5 GG.

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD) T.C.21 GG.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASIDI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

