



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 14

DATA 14/06/2011

### ALBICOCCO-PESCO (PRE-RACCOLTA)

#### MONILIA

VISTO LO SVILUPPO DELLA MALATTIA, A SEGUITO DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI, SI RICORDA CHE IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA È POSSIBILE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AL LORO TEMPO DI CARENZA, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FENBUCONAZOLO** (SIMITAR 5 EW, INDAR) T.C.7 GG.(3 GG. SU PESCO)

OPPURE

**TEBUCONAZOLO** (FOLICUR) T.C.7 GG.

(CON IBE MASSIMO 4 INT./ANNO SU PESCO, 3 INT./ANNO SU ALBICOCCO)

OPPURE

**FENEXAMIDE** (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

**BOSCALID** (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



## PESCO (PRE-RACCOLTA)

---

### CYDIA

IL MONITORAGGIO IN GENERALE EVIDENZIA UNA SITUAZIONE STAZIONARIA, CON TENDENZA ALLA DIMINUIZIONE DEL VOLO.

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA ED IN PRESENZA DI PUNTE CIDIATE OLTRE I LIMITI SOGLIA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA DEI FORMULATI ED ALL'EPOCA DI MATURAZIONE DELLE PESCHE:

**CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) T.C. 15 GG.**

OPPURE

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) T.C. 7GG. (AL MASSIMO 2 INT./ANNO)**

OPPURE

**INDOXACARB (STEWART) T.C. 7 GG. (MASSIMO 2 INT./ANNO)**

OPPURE

**ETOFENPROX (TREBON) T.C. 7 GG (MASSIMO 2 INT./ANNO)**

OPPURE

**FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO) T.C. 28 GG.**

(I PRODOTTI INDICATI SONO ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)





Coldiretti Alessandria



 Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

### CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO ATTRAVERSO LE TRAPPOLE A FEROMONI IN GENERALE SEGNA LA PRESENZA BASSA DI ADULTI, MENTRE IN ALTRI CASI SI SEGNA LA RIPRESA DEL VOLO: SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ENTRO FINA SETTIMANA CON FORMULATI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

**METOSSIFENOZIDE** (INTREPID, PRODIGY) (MASSIMO 4 INTERVENTI)  
OPPURE

**RYNAXYPYR** (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE

**TEBUFENOZIDE** (MIMIC)

(MASSIMO 4 INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE)

### TICCHIOLATURA

NEI FRUTTETI CHE SI TROVANO IN ASSENZA DI MACCHIE SI RITIENE DI POTER SOSPENDERE GLI INTERVENTI ANTI-TICCHIOLATURA. NEI FRUTTETI, INVECE, CON INFEZIONI DI TICCHIOLATURA IN ATTO (PRESENZA DI MACCHIE SULLE FOGLIE), SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA, IN PREVISIONE DI POSSIBILI PIOGGE CON PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI:

**DITHIANON** (DELAN WG)

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA

STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T O T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68).

