



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 15
27/06/2012

PESCO
(PRE-RACCOLTA)

CYDIA MOLESTA

ANCHE SE I MODELLI PREVISIONALI REGIONALI INDICANO CHE SIAMO ANCORA NELLA FASE LARVALE DELLA SECONDA GENERAZIONE, I MONITORAGGI ATTRAVERSO LE TRAPPOLE A FEROMONI, INDICANO UNA RIPRESA DEL VOLO. VISTA LA FASE FENOLOGICA IMPORTANTE, SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE VERSO LA FINE DELLA CORRENTE SETTIMANA CON PRODOTTI A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, PRODIGY) (MASSIMO 4 INTERVENTI)
OPPURE
CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)
OPPURE
TIACLOPRID (CALIPSO) (AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO)

PER CHI DECIDESSE DI INTERVENIRE SUCCESSIVAMENTE, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.)(2 INT./ANNO) T.C. 15 GG
OPPURE
EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 7 GG
OPPURE
FOSMET (SPADA) (2 INT./ANNO) T.C.28 GG
OPPURE
CLORPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX) (AL MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 30 GG

(I PRODOTTI INDICATI SONO ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)





Coldiretti Alessandria



SUSINO (PRE-RACCOLTA)

CYDIA FUNEBRANA

PER CHI NON AVESSE ANCORA TRATTATO, NEI FRUTTETI CON PRESENZA DELL'INSETTO SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ENTRO LA SETTIMANA CON PRODOTTI A BASE DI:

FOSMET (SPADA) (TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

PESCO (PRE-RACCOLTA)

MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA È POSSIBILE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AL LORO TEMPO DI CARENZA, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR) T.C.7 GG.(3 GG. SU PESCO)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.

(CON IBE MASSIMO 4 INT./ANNO SU PESCO, 3 INT./ANNO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

I MONITORAGGI NON SEGNALANO ANCORA UNA RIPRESA DEL VOLO PER CUI SI CONSIGLIA DI ATTENDERE PROSSIME INDICAZIONI OPPURE DI CONSULTARE IL BOLLETTINO PRECEDENTE

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T O T+) CON FRASIDI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

