



Coldiretti Alessandria



## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 15

DATA 21/06/2011

### PESCO (PRE-RACCOLTA)

#### MONILIA

VISTO LO SVILUPPO DELLA MALATTIA, A SEGUITO DELLE PRECEDENTI CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI, SI RICORDA CHE IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA È POSSIBILE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FENBUCONAZOLO** (SIMITAR 5 EW, INDAR) T.C.7 GG.(3 GG. SU PESCO)

OPPURE

**TEBUCONAZOLO** (FOLICUR) T.C.7 GG.

(CON IBE MASSIMO 4 INT./ANNO SU PESCO, 3 INT./ANNO SU ALBICOCCO)

OPPURE

**FENEXAMIDE** (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

**BOSCALID** (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



## PESCO (PRE-RACCOLTA)

---

### CYDIA

IL MONITORAGGIO IN GENERALE EVIDENZIA LA RIPRESA DEL VOLO: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE OVO-LARVICIDA A BASE DI:

**METOSSIFENOZIDE (INTREPID, PRODIGY) (MASSIMO 4 INTERVENTI)**

NELLE ALTRE SITUAZIONI, IN PRESENZA DI PUNTE CIDIATE, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UN TRATTAMENTO CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

**CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) T.C. 15 GG.**

OPPURE

**SPINOSAD (LASER) T.C. 7 GG. (MASSIMO 3 INT./ANNO)**

OPPURE

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) T.C. 7GG. (MASSIMO 2 INT./ANNO)**

OPPURE

**INDOXACARB (STEWART) T.C. 7 GG. (MASSIMO 2 INT./ANNO)**

OPPURE

**ETOFENPROX (TREBON) T.C. 7 GG (MASSIMO 2 INT./ANNO)**

OPPURE

**FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO) T.C. 28 GG.**

(I PRODOTTI INDICATI SONO ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)

SI RACCOMANDA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA DEI FORMULATI IN BASE ALL'EPOCA DI MATURAZIONE DELLE PESCHE:





Coldiretti Alessandria



## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

### CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO ATTRAVERSO LE TRAPPOLE A FEROMONI IN GENERALE SEGNA LA PRESENZA BASSA DI ADULTI, MENTRE IN ALTRI CASI SI CONFERMA LA RIPRESA DEL VOLO: IN SITUAZIONI DI MONITORAGGI OLTRE LA SOGLIA, PER CHI NON FOSSE INTERVENUTO CON PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

**CLORPYRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX)**

OPPURE

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)(AL MASSIMO 2 INT./ANNO)**

OPPURE

**FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO)**

### TICCHIOLATURA

NEI FRUTTETI CON INFEZIONI DI TICCHIOLATURA IN ATTO (PRESENZA DI MACCHIE SULLE FOGLIE), SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA, IN PREVISIONE DI POSSIBILI PIOGGE CON PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI:

**DITHIANON (DELAN WG)**





Coldiretti Alessandria



## SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI) CIDIA FUNEBRANA

---

IN SITUAZIONI DI PRESENZA DI ADULTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

**SPINOSAD (LASER)** T.C. 7 GG. (MASSIMO 3 INT./ANNO)

OPPURE

**ETOFENPROX (TREBON)** T.C. 7 GG (MASSIMO 2 INT./ANNO)

OPPURE

**FOSMET (SPADA WDG)** (MASSIMO 3 INT./ANNO) T.C. 14 GG.

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68).

