




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 16

DATA 27/06/2011

PESCO (PRE-RACCOLTA)

CYDIA

IL MONITORAGGIO IN GENERALE EVIDENZA UNA FASE STAZIONARIA DEL VOLO (ALCUNE SITUAZIONI IN CALO): PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO CON FORMULATI AD AZIONE OVO-LARVICIDA, ED IN SITUAZIONI DI PRESENZA DI PUNTE CIDIATE, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UN TRATTAMENTO CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) T.C. 15 GG.

OPPURE

SPINOSAD (LASER) T.C. 7 GG. (MASSIMO 3 INT./ANNO)

OPPURE

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) T.C. 7GG. (MASSIMO 2 INT./ANNO)

OPPURE

INDOXACARB (STEWART) T.C. 7 GG. (MASSIMO 2 INT./ANNO)

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) T.C. 7 GG (MASSIMO 2 INT./ANNO)

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO) T.C. 28 GG.

(I PRODOTTI INDICATI SONO ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)





Coldiretti Alessandria



PESCO (PRE-RACCOLTA)

MONILIA

VISTO LO SVILUPPO DELLA MALATTIA, A SEGUITO DELLE PRECEDENTI CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI, SI RICORDA CHE IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA È POSSIBILE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR) T.C.3 GG.

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.

(CON IBE MASSIMO 4 INT./ANNO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

SI RACCOMANDA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA DEI FORMULATI IN BASE ALL'EPOCA DI MATURAZIONE DELLE PESCHE:

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA

STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T O T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68).

