



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 17

17/07/2012

**PESCO
(PRE-RACCOLTA)**

CYDIA MOLESTA

CONTINUA IL MONITORAGGIO ATTRAVERSO LE TRAPPOLE A FEROMONI, CON INDICAZIONI CHE CONFERMANO, IN GENERALE SUL TERRITORIO, L'AUMENTO DEGLI ADULTI: VISTA LA FASE FENOLOGICA IMPORTANTE, SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE VERSO LA FINE DELLA CORRENTE SETTIMANA CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, PRODIGY)

(MASSIMO 4 INTERVENTI) T.C. 7 GG

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN)

(MASSIMO 2 INTERVENTI) T.C. 14 GG

(I PRODOTTI INDICATI SONO ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)

OIDIO

SI SEGNA LA PRESENZA DI INFEZIONI IN ATTO: NEI PESCHETI A RISCHIO D'INFEZIONE, VISTE LE CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, SI CONSIGLIA DI AGGIUNGERE UN PRODOTTO SPECIFICO ANTIOIDICO A BASE DI:

QUINOXIFEN (ARIUS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO) T.C 14 GG

OPPURE

ZOLFO (VARI) T.C. 5 GG.

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD) T.C.21 GG.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO-SUSINO (PRE-RACCOLTA)

MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA È POSSIBILE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AL LORO TEMPO DI CARENZA, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR) T.C.3 GG.

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.

(CON IBE MASSIMO 4 INT./ANNO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

SUSINO (PRE-RACCOLTA)

CYDIA FUNEBRANA

NEI FRUTTETI CON PRESENZA DELL'INSETTO SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ENTRO LA SETTIMANA CON PRODOTTI A BASE DI:

FOSMET (SPADA) (TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

TIACLOPRID (CALIPSO) (AL MASSIMO UN INT./ANNO). T.C. 14 GG





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

IN SITUAZIONI DI MONITORAGGI OLTRE LA SOGLIA (PRESENZA DI FRUTTI BACATI FRESCHI SUPERIORE ALL'1%), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

CLOPPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX) (AL MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 30 GG

OPPURE

CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.)(3 INT./ANNO) T.C. 15 GG

OPPURE

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)(AL MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO 3 INT./ANNO) T.C 14 GG.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T O T+) CON FRASIDI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

