




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

**BOLLETTINO N° 18**

**DATA 18/07/2011**

**PESCO**  
**(PRE-RACCOLTA)**

**CYDIA**

IL MONITORAGGIO IN GENERALE EVIDENZIA UN ANDAMENTO COSTANTE DELLE CATTURE: IN SITUAZIONI DI PRESENZA ELEVATA, IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA E DELL'EPOCA DI MATURAZIONE, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UN TRATTAMENTO CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

**CLORPYRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) T.C. 15 GG.**

OPPURE

**SPINOSAD (LASER) T.C. 7 GG. (MASSIMO 3 INT./ANNO)**

OPPURE

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) T.C. 7GG. (MASSIMO 2 INT./ANNO)**

OPPURE

**INDOXACARB (STEWART) T.C. 7 GG. (MASSIMO 2 INT./ANNO)**

OPPURE

**ETOFENPROX (TREBON) T.C. 7 GG (MASSIMO 2 INT./ANNO)**

(I PRODOTTI INDICATI SONO ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)





Coldiretti Alessandria



## PESCO - SUSINO (PRE-RACCOLTA)

---

### MONILIA

VISTO LO SVILUPPO DELLA MALATTIA, A SEGUITO DELLE PRECEDENTI CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI, SI RICORDA CHE IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA È POSSIBILE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

OPPURE

**BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

OPPURE

**FENBUCONAZOLO\* (SIMITAR 5 EW, INDAR) T.C.3 GG.**

OPPURE

**TEBUCONAZOLO\* (FOLICUR) T.C.7 GG.**

(\*CON IBE MASSIMO 4 INT./ANNO)

## SUSINO (PRE-RACCOLTA)

---

### CYDIA

IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA E DELL'EPOCA DI MATURAZIONE, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UN TRATTAMENTO CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

**SPINOSAD (LASER) T.C. 7 GG. (MASSIMO 3 INT./ANNO)**

OPPURE

**ETOFENPROX (TREBON) T.C. 7 GG (MASSIMO 3 INT./ANNO)**

OPPURE

**FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.**





Coldiretti Alessandria



## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI) CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO ATTRAVERSO LE TRAPPOLE A FEROMONI IN GENERALE SEGNA UN AUMENTO DELLA PRESENZA DI ADULTI: IN GENERALE SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

**CLORPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX) (AL MASSIMO TRE INT./ANNO)**

OPPURE

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)(AL MASSIMO 2 INT./ANNO)**

OPPURE

**FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO)**

SI RACCOMANDA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA DEI FORMULATI IN BASE ALL'EPOCA DI MATURAZIONE DELLE PESCHE

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68).

