



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 19

02/08/2012

PESCO (PRE-RACCOLTA)

CYDIA MOLESTA

I MONITORAGGI ATTRAVERSO LE TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI CONFERMANO CATTURE ELEVATE. SI CONSIGLIA PERTANTO DI MANTENERE LA COPERTURA CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (2 INT./ANNO) T.C. 15 GG

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 7 GG

ETOFENPROX (TREBON) (2 INT./ANNO) T.C.7 GG

INDOXACARB (STEWART) (2 INT./ANNO) T.C.7 GG

BACILLUS THURINGENSIS (VARI) T.C.3 GG.

(I PRODOTTI INDICATI SONO ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)

PESCO-SUSINO (PRE-RACCOLTA)

MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA È POSSIBILE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AL LORO TEMPO DI CARENZA, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR) T.C.3 GG.

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.

(CON IBE MASSIMO 4 INT./ANNO)

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

SUSINO (PRE-RACCOLTA)

CYDIA FUNEBRANA

NEI FRUTTETI CON PRESENZA DELL'INSETTO SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ENTRO LA SETTIMANA CON PRODOTTI A BASE DI:

FOSMET (SPADA) (TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

SPINOSAD (LASER) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

SI CONSIGLIA DI PROSEGUIRE I MONITORAGGI: IN SITUAZIONI OLTRE LA SOGLIA (PRESENZA DI FRUTTI BACATI FRESCHI SUPERIORE ALL'1%), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.)(3 INT./ANNO) T.C. 15 GG

OPPURE

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)(AL MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO 3 INT./ANNO) T.C. 14 GG.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

MARCIUMI

SULLE VARIETÀ ESTIVE, PER PREVENIRE LO SVILUPPO DI FUNGHI CHE CAUSANO MARCIUMI DEI FRUTTI DURANTE LA FASE DI CONSERVAZIONE, È CONSIGLIABILE EFFETTUARE UN INTERVENTO CON FORMULATI A BASE DI:

CAPTANO (MERPAN 80 WDG)(AL MASSIMO 3 INT./ANNO) T.C. 21 GG
OPPURE

BOSCALID + PYRACLOSTRBIN (BELLIS))(AL MASSIMO 3 INT./ANNO)
T.C. 7 GG

OPPURE

FLUDIOXONIL (GEOXE)(AL MASSIMO 1 INT./ANNO) T.C. 7 GG

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T O T+) CON FRASIDI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

