



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 19

DATA 03/08/2011

### PESCO (PRE-RACCOLTA)

#### CYDIA

IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA E DELL'EPOCA DI MATURAZIONE, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UN TRATTAMENTO CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

**CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.)** T.C. 15 GG. (MASSIMO 2 INT./ANNO)

OPPURE

**SPINOSAD (LASER)** T.C. 7 GG. (MASSIMO 3 INT./ANNO)

OPPURE

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)** T.C. 7GG. (MASSIMO 2 INT./ANNO)

OPPURE

**INDOXACARB (STEWART)** T.C. 7 GG. (MASSIMO 2 INT./ANNO)

OPPURE

**ETOFENPROX (TREBON)** T.C. 7 GG (MASSIMO 2 INT./ANNO)

OPPURE

PRODOTTI A BASE DI **BACILLUS THURINGENSIS** T.C. 3 GG.

(I PRODOTTI INDICATI SONO ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)





Coldiretti Alessandria



## PESCO - SUSINO (PRE-RACCOLTA)

---

### MONILIA

VISTO LO SVILUPPO DELLA MALATTIA, A SEGUITO DELLE PRECEDENTI CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI, SI RICORDA CHE IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA È POSSIBILE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

OPPURE

**BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

OPPURE

**FENBUCONAZOLO\* (SIMITAR 5 EW, INDAR) T.C.3 GG.**

OPPURE

**TEBUCONAZOLO\* (FOLICUR) T.C.7 GG.**

(\*CON IBE MASSIMO 4 INT./ANNO)

## SUSINO (PRE-RACCOLTA)

---

### CYDIA

IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA E DELL'EPOCA DI MATURAZIONE, PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UN TRATTAMENTO CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

**SPINOSAD (LASER) T.C. 7 GG. (MASSIMO 3 INT./ANNO)**

OPPURE

**ETOFENPROX (TREBON) T.C. 7 GG (MASSIMO 3 INT./ANNO)**

OPPURE

**FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.**





Coldiretti Alessandria



## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

### CARPOCAPSA

IN SITUAZIONI DI MONITORAGGI OLTRE LA SOGLIA (PRESENZA DI FRUTTI BACATI FRESCHI SUPERIORE ALL'1%), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

**CLORPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX)** (AL MASSIMO TRE INT./ANNO)

OPPURE

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)**(AL MASSIMO 2 INT./ANNO)

OPPURE

**FOSMET (SPADA)** (MASSIMO TRE INT./ANNO)

SI RACCOMANDA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA DEI FORMULATI IN BASE ALL'EPOCA DI MATURAZIONE DELLE PESCHE

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA

STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T O T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68).

