



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 02
21/03/2012

PESCO (BOTTONI ROSA)

BOLLA-CORINEO

PER LE AZIENDE CHE NON SONO ANCORA INTERVENUTE, SI RICORDA CHE È ANCORA POSSIBILE IN QUESTO PERIODO RINNOVARE LA COPERTURA (PER PRODOTTI DA IMPIEGARE, VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE)

COCCINIGLIA

PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO TRATTAMENTI, SI RICORDA CHE E' ANCORA POSSIBILE INTERVENIRE, IN SITUAZIONI DI FORTE INFESTAZIONE ED ENTRO LA FASE DI BOTTONI ROSA, CON PRODOTTI A BASE DI:

OLIO MINERALE(VARI) IN DOSI DI 2L./HL

IN CASO DI FORTI INFESTAZIONI EFFETTUARE LA MISCELA

PIRIPROXYFEN (JUVINAL, ADMIRAL) ALLA DOSE DI 0,32/L./HA + **OLIO MINERALE(VARI)** IN DOSI DI L1/HL

CANCRI RAMEALI

E' POSSIBILE EFFETTUARE UN TRATTAMENTO SPECIFICO IN PRE-FIORITURA CON PRODOTTI A BASE DI **TIOFANATE METILE (VARI)**.

SI RICORDA CHE PER TALE TRATTAMENTO E' PREVISTA L'AUTORIZZAZIONE DEL TECNICO.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (BOTTONI ROSA)

TRIPIDI/ANARSIA

NELLE ZONE A RISCHIO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON
FLUVALINATE (MAVRIK 20 EW, KLARTAN 20 EW)

CILIEGIO-SUSINO (BOTTONI SEPARATI-PREFIORITURA)

CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:
THIRAM (VARI)

ALBICOCCO (INIZIO FIORITURA)

MONILIA

SI RICORDA CHE E' POSSIBILE INTERVENIRE IN POST-FIORITURA
CON PRODOTTI A BASE DI:

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)

CYPRODINIL (CHORUS)

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE
DALL'AVVERSITA')

MICLOBUTANIL *(THIOCUR FORTE)

FENBUCONAZOLO* (SIMITAR 5 EW)

TEBUCONAZOLO* (FOLICUR SE)

PROPICONAZOLO* (VARI)

(*I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI TRE VOLTE ALL'ANNO
INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (ROTTURA GEMME-PUNTE VERDI)

TICCHIOLATURA

LE PREVISIONI METEOROLOGICHE PER I PROSSIMI GIORNI IPOTIZZANO CONDIZIONI DI TEMPO STABILE CON ALTA PRESSIONE ED ASSENZA DI PIOGGE: SI CONSIGLIA PERTANTO DI ATTENDERE AD EFFETTUARE TRATTAMENTI, IN ATTESA DI EVENTUALI PRECIPITAZIONI.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.
- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

