




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 20

DATA 11/08/2011

### PESCO (PRE-RACCOLTA)

#### CYDIA

VISTA LA PRESENZA DELL'INSETTO ABBASTANZA DIFFUSA SUL TERRITORIO IN QUESTA FASE FINALE DELLA COLTURA, NEL RISPETTO DEI TEMPI DI CARENZA, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UN TRATTAMENTO CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

**SPINOSAD (LASER)** T.C. 7 GG. (MASSIMO 3 INT./ANNO)

OPPURE

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)** T.C. 7GG. (MASSIMO 2 INT./ANNO)

OPPURE

**INDOXACARB (STEWART)** T.C. 7 GG. (MASSIMO 2 INT./ANNO)

OPPURE

**ETOFENPROX (TREBON)** T.C. 7 GG (MASSIMO 2 INT./ANNO)

OPPURE

PRODOTTI A BASE DI **BACILLUS THURINGENSIS** T.C. 3 GG.

(I PRODOTTI INDICATI SONO ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)





Coldiretti Alessandria



## PESCO - SUSINO (PRE-RACCOLTA)

---

### MONILIA

VISTO LO SVILUPPO DELLA MALATTIA, A SEGUITO DELLE PRECEDENTI CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI, SI RICORDA CHE IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA È POSSIBILE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

OPPURE

**BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

OPPURE

**FENBUCONAZOLO\* (SIMITAR 5 EW, INDAR) T.C.3 GG.**

OPPURE

**TEBUCONAZOLO\* (FOLICUR) T.C.7 GG.**

(\*CON IBE MASSIMO 4 INT./ANNO)

## SUSINO (PRE-RACCOLTA)

---

### CYDIA

IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA E DELL'EPOCA DI MATURAZIONE, PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UN TRATTAMENTO CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

**SPINOSAD (LASER) T.C. 7 GG. (MASSIMO 3 INT./ANNO)**

OPPURE

**ETOFENPROX (TREBON) T.C. 7 GG (MASSIMO 3 INT./ANNO)**

OPPURE

**FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.**





Coldiretti Alessandria



**Confagricoltura**  
Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

### CARPOCAPSA

IN SITUAZIONI DI MONITORAGGI OLTRE LA SOGLIA (PRESENZA DI FRUTTI BACATI FRESCHI SUPERIORE ALL' 1%), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

**CLORPIRIFOS METILE (RELDAN) TC. 15 GG (AL MASSIMO 2 INT./ANNO)**

OPPURE

**FOSMET (SPADA WDG) T.C. 14 GG (MASSIMO TRE INT./ANNO)**

OPPURE

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)TC.7GG (AL MASSIMO 2 INT./ANNO)**

OPPURE

**SPINOSAD (LASER) T.C. 7 GG (MASSIMO TRE INT./ANNO)**

### MARCIUME DA CONSERVAZIONE

IN SITUAZIONI A RISCHIO PER SENSIBILITA' VARIETALE E CONDIZIONI COLTURALI FAVOREVOLI , NEL RISPETTO DEI TEMPI DI CARENZA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI A BASE DI:

**VARIETA' PRECOCI: BOSCALID + PYRACLOSTROBIN (BELLIS) T.C. 7 GG (AL MASSIMO TRE INT./ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')**

**VARIETA' TARDIVE: CAPTANO (MERPAN 80 WG) T.C.21 GG (AL MASSIMO TRE INT./ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')**

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T O T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68).

