



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 03  
28/03/2012

### PESCO-SUSINO-CILIEGIO (FIORITURA)

VISTA LA FASE FENOLOGICA, NON SONO PREVISTI TRATTAMENTI

### ALBICOCCO (CADUTA PETALI)

#### MONILIA

PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO, SI RICORDA CHE A CADUTA PETALI E' POSSIBILE EFFETTUARE IL SECONDO TRATTAMENTO CON PRODOTTI A BASE DI:

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)**

**CYPRODINIL (CHORUS)**

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

**MICLOBUTANIL \*(THIOCUR FORTE)**

**FENBUCONAZOLO\* (SIMITAR 5 EW)**

**TEBUCONAZOLO\* (FOLICUR SE)**

**PROPICONAZOLO\* (VARI)**

(\*I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI TRE VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

#### ANARSIA

NELLE ZONE A RISCHIO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON **ETOFENPROX (TREBON)** (ATTIVO ACHE CONTRO ALTRI INSETTI PATOGENI)

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA,





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (MAZZETTI SEPARATI-BOTTONI BIANCHI)

---

### OIDIO

NELLE SITUAZIONI A RISCHIO (PRESENZA DI ATTACCHI LO SCORSO ANNO), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTIOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI)

OPPURE

QUINOXIFEN (ARIUS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

### TICCHIOLATURA

AL MOMENTO LE CONDIZIONI CLIMATICHE NON PREVEDONO RISCHI D'INFEZIONE. QUALORA SI VERIFICASSE UN PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE, CONSIDERATA LA FASE FENOLOGICA AD ALTO RISCHIO DI INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE LA COPERTURA DELLA VEGETAZIONE CON PRODOTTI A BASE DI:

DITHIANON (DELAN WG, KUKI WG, TIANON WG)

OPPURE

PROPINEB (ANTRACOL 70 WG)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (MAZZETTI SEPARATI-BOTTONI BIANCHI)

---

### AFIDI

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FLUVALINATE (MAVRIK)**(AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO)

**IMIDACLOPRID\*** (CONFIDOR, ) (AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO) (EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO)

**TIAMETOXAM\*** (ACTARA) (AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO)

\*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: COMPLESSIVAMENTE AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO

**FLONICAMID (TEPPEKI)**(AL MASSIMO DUE TRATTAMENTI ALL'ANNO)

**PIRIMICARB (PIRIMOR)**

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.
- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

