



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 04

DATA 05/04/2011

PESCO

(PIENA FIORITURA-CADUTA PETALI)

AFIDI

PER LE AZIENDE CHE NON HANNO PROVVEDUTO AD EFFETTUARE IL TRATTAMENTO SPECIFICO IN FASE DI BOTTONI ROSA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

IMIDACLOPRID (CONFIDOR 200 SL) 50 G/HL

OPPURE

TIAMETOXAM (ACTARA 25 WG)

OPPURE

PIRIMICARB (PIRIMOR 17,5 EC)

AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO

EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO.

MONILIA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

PROPICONAZOLO (PROTIL)

(EFFICACE ANCHE CONTRO OIDIO E BOLLA)

BOLLA DEL PESCO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ZIRAM (VARI)/TIRAM (POMARSOL 50WG)/CAPTANO (VARI)

(IN ALTERNATIVA TRA LORO E SONO PREVISTI AL MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO CON QUESTI PRODOTTI).





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (PRE-FIORITURA)

TICCHIOLATURA

LE PREVISIONI METEOROLOGICHE PER I PROSSIMI 6-7 GIORNI IPOTIZZANO CONDIZIONI DI TEMPO STABILE CON ALTA PRESSIONE ED ASSENZA DI PIOGGE: SI CONSIGLIA PERTANTO DI SOSPENDERE MOMENTANEAMENTE LA DIFESA, IN ATTESA DI EVENTUALI PRECIPITAZIONI.

AFIDE GRIGIO/VERDE

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLUVALINATE (MAVRIK)(AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO)

OPPURE

IMIDACLOPRID (CONFIDOR)(EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO)

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI)(AL MASSIMO DUE TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

PIRIMICARB (PIRIMOR)

CILIEGIO-SUSINO (FIORITURA)

MONILIA

NELLE SITUAZIONI PRECOCI IN FASE DI CADUTA PETALI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW)

OPPURE

BITERTANOLO (PROCLAIM)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR SE)

OPPURE

PROPICONAZOLO (TILT 25 EC)

CON GLI I.B.E. AL MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO-SUSINO (FIORITURA)

CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:
THIRAM (VARI)

TENTREDINE DEL SUSINO

IN SITUAZIONI A RISCHIO PER PRESENZA DI DANNI NELLE PASSATE STAGIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE, A CADUTA PETALI, CON PRODOTTI A BASE DI:

IMIDACLOPRID (CONFIDOR)

AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO

EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.
- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68).

