



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 05

DATA 12/04/2011

PESCO

(CADUTA PETALI - SCAMICIATURA)

CYDIA MOLESTA

IL MONITORAGGIO CON TRAPPOLE A FEROMONI SEGNA UN ELEVATO NUMERO DI CATTURE; CONSIDERATE LE SOGLIE TERMICHE, E' CONSIGLIABILE INIZIARE AD UTILIZZARE I PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA PER LA FINE DELLA CORRENTE SETTIMANA. PERTANTO, PER LE AZIENDE CHE INTENDONO ADOTTARE TALE STRATEGIA DI DIFESA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, PRODIGY) (MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OIDIO

NELLE SITUAZIONI A RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE UN PRODOTTO SPECIFICO A BASE DI:

BUPIRIMATE (NIMROD)

OPPURE

ZOLFO BAGNABILE (VARI)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (FIORITURA)

TICCHIOLATURA

QUALORA SI VERIFICASSE UN PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE, CONSIDERATA LA FASE FENOLOGICA AD ALTO RISCHIO DI INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA DELLA VEGETAZIONE CON PRODOTTI A BASE DI:

MANCOZEB (DITHANE M-45/DG)

OPPURE

DITHIANON (DELAN WG, KUKI WG, TIANON WG)

SI RICORDA CHE TALE INTERVENTO NEI FRUTTETI ANCORA IN FIORITURA SARA' POSSIBILE **SOLAMENTE SE VERRA' CONCESSA L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE**: SI CONSIGLIA PERTANTO DI CONTATTARE I PROPRI TECNICI PRIMA DI EFFETTUARE IL TRATTAMENTO.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO-SUSINO (CADUTA PETALI)

AFIDI

PER LE AZIENDE CHE NON HANNO EFFETTUATO ANCORA TRATTAMENTI SPECIFICI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

IMIDACLOPRID* (CONFIDOR)(SOLAMENTE SU **CILIEGIO**)EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO)

OPPURE

THIAMETOXAM* (ACTARA)

OPPURE

ACETAMIPRID* (EPIK)

(*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.
- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68).

