



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 06
17/04/2012

MELO-PERO (CADUTA PETALI)

TICCHIOLATURA

VISTO IL PERDURARE DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE INSTABILI, CON PREVISIONE DI PIOGGIA ANCHE PER I PROSSIMI GIORNI, SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON PRODOTTI A BASE DI:

DITHIANON (DELAN WG, KUKI WG, TIANON WG)

OPPURE

PROPINEB (ANTRACOL 70 WG)(MASSIMO 2 TRATTAMENTI/ANNO)

IN CASO DI INTERVENTI SUCCESSIVI ALLE PIOGGE, SI RICORDA CHE E' POSSIBILE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE CON **PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA**

PIRIMETANIL (SCALA) / CIPRODINIL (CHORUS) (CON ANILINOPIRIMIDINE MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE CON

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(MICLOBUTANIL, FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO) IN MISCELA CON I PRODOTTI DI COPERTURA.

DIRADAMENTO CHIMICO DEL MELO

VISTA LA FASE FENOLOGICA, SI CONSIGLIA DI CONTATTARE I TECNICI DI RIFERIMENTO PER INDICAZIONI TECNICHE.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:
THIRAM (POMARSOL 80 WG) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
CAPTANO (MERPAN 80 WDG) (MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO, IN ALTERNATIVA A THIRAM)

OIDIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:
ZOLFO BAGNABILE (VARI)
QUINOXYFEN (ARIUS)(MASSIMO 3 INTERVENTI/ANNO)
BUPIRIMATE (NIMROD 250 EW)
CIPROCONAZOLO (GALEO)(CON IBE MASSIMO 3 TERVENTI/ANNO;
NON SONO CONSENTITE FORMULAZIONI XN)

SUSINO

(CADUTA PETALI)

CYDIA FUNEBRANA

IL MODELLO MATEMATICO PREVEDE, NELLE ZONE PIU' PRECOCI, L'INIZIO DELL'OVIDEPOSIZIONE: NEI FRUTTETI DANNEGGIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI, E' POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTO AD AZIONE OVOLARVICIDA A BASE DI:

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)
IN TUTTE LE ALTRE SITUAZIONI SI PREVEDE DI INTERVENIRE SULLA SECONDA GENERAZIONE.

CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE A CADUTA PETALI CON PRODOTTI A BASE DI:
THIRAM (POMARSOL 80 WG) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
ZIRAM (TRISCABOL DG) (MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO, IN ALTERNATIVA A THIRAM)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (SCAMICIATURA)

CYDIA MOLESTA

IN CONSIDERAZIONE DEL MONITORAGGIO CON TRAPPOLE A FEROMONI E DEI MODELLI PREVISIONALI, NEI FRUTTETI A RISCHIO (PER PRESENZA DI DANNI NEGLI ANNI PRECEDENTI), E' CONSIGLIABILE INIZIARE AD UTILIZZARE I PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA PER LA FINE DELLA CORRENTE SETTIMANA, A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, PRODIGY) (MASSIMO 4 INTERVENTI)
OPPURE
CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OIDIO

NELLE SITUAZIONI A RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE UN PRODOTTO SPECIFICO A BASE DI:

BUPIRIMATE (NIMROD)
OPPURE
ZOLFO BAGNABILE (VARI)

CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE A CADUTA PETALI CON PRODOTTI A BASE DI:

THIRAM (POMARSOL 80 WG)
ZIRAM (TRISCABOL DG)
(THIRAM E ZIRAM SONO IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
OPPURE
CAPTANO (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
COMPLESSIVAMENTE AL MASSIMO 3 INTERVENTI/ANNO





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (SCAMICIATURA)

MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UN TRATTAMENTO CON PRODOTTI A BASE DI:

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) *

CYPRODINIL (CHORUS)*

(*MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

MICLOBUTANIL ** (THIOCUR FORTE)

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW)**

TEBUCONAZOLO (FOLICUR SE)**

PROPICONAZOLO (VARI: EFFICACI ANCHE CONTRO OIDIO)**

(**I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI QUATTRO VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

