



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 06

DATA 19/04/2011

**PESCO
(SCAMICIATURA)**

CYDIA MOLESTA

IL MONITORAGGIO ATTRAVERSO I CONTROLLI SULLA VEGETAZIONE, SEGNA LA PRESENZA DI ADULTI, ANCHE SE IN CALO RISPETTO ALLA SETTIMANA SCORSA. PER LE AZIENDE CHE NON HANNO ANCORA EFFETTUATO IL TRATTAMENTO OVICIDA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE OVO-LARVICIDA BASE DI:

**METOSSIFENOZIDE (INTREPID, PRODIGY) (MASSIMO 4 INTERVENTI)
OPPURE
CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)**

NELLE SITUAZIONI DI AVANZATO STADIO FENOLOGICO SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE UN FORMULATO AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)
OPPURE
CLORPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX)
OPPURE
FOSMET (SPADA)**





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (CADUTA PETALI)

TICCHIOLATURA

LE CONDIZIONI CLIMATICHE ASCIUTTE DI QUESTO PERIODO, NON DEVONO INDURRE A TRASCURARE LA DIFESA CONTRO TALE AVVERSITÀ. SI RICORDA PERTANTO, DI RINNOVARE LA COPERTURA DELLA VEGETAZIONE ED IN PARTICOLARMENTE PRIMA DI UNA POSSIBILE PIOGGIA, PREVISTA PER IL FINE SETTIMANA. PER TALI RAGIONI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

MANCOZEB (DITHANE M-45/DG)

OPPURE

DITHIANON (DELAN WG, KUKI WG, TIANON WG)

OIDIO

LE ASSENZE DI PIOGGIA E IL CLIMA DI QUESTI GIORNI CREANO LE CONDIZIONI FAVOREVOLI PER LO SVILUPPO DI TALE MALATTIA; IN MODO PARTICOLARE DOVE LO SCORSO ANNO SI SONO EVIDENZIATI FORTI ATTACCHI DI MAL BIANCO, SI CONSIGLIA DI AGGIUNGERE AL PRODOTTO ANTITICCHIOLATURA UNO SPECIFICO ANTIOIDICO A BASE DI:

QUINOXIFEN (ARIUS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

ZOLFO (VARI)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

AFIDI

PER QUEI FRUTTETI IN CUI NON SI È INTERVENUTI CON TRATTAMENTO PRE-FIORALE, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ALLA CADUTA PETALI TOTALE, CON PRODOTTI A BASE DI:

IMIDACLOPRID (CONFIDOR 200 SL ETC..) 50 G/HL

IL PRODOTTO PRESENTA UN'ATTIVITÀ COLLATERALE NEI CONFRONTI DEI FILLOMINATORI





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (CADUTA PETALI)

TORTTRICIDI RICAMATORI

NEI FRUTTETI IN CUI SI RILEVANO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLUFENOXURON (VARI)

DIRADAMENTO CHIMICO DEI FRUTTI

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI CHE HANNO CARATTERIZZATO LA FASE DI FIORITURA ED ALLEGAGIONE, E' POSSIBILE INTERVENIRE CON I FITOREGOLATORI PER IL DIRADAMENTO DEI FRUTTI: IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI IN CUI E' AVVENUTA LA FIORITURA, DELLA VARIETA' E DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE, SI RACCOMANDA DI SEGUIRE LE INDICAZIONI DEI TECNICI.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.
- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68).

