



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

**BOLLETTINO N° 07**  
26/04/2012

### **MELO** (FINE CADUTA PETALI)

#### **TICCHIOLATURA**

CONSIDERATA LA FASE FENOLOGICA PARTICOLARMENTE DELICATA E VISTO IL PERDURARE DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE INSTABILI, SI CONSIGLIA DI RINNOVARE LA COPERTURA DELLA VEGETAZIONE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AD ANTICIPARE IL TRATTAMENTO PRIMA DI UNA POSSIBILE PIOGGIA.

#### **CARPOCAPSA**

SI CONSIGLIA DI ATTENDERE I PROSSIMI BOLLETTINI, IN BASE ALL'EVOLUZIONE DEI MONITORAGGI.

#### **TORTRICIDI RICAMATORI**

SI RACCOMANDA DI EFFETTUARE IL CONTROLLO DEI MAZZETTI PER RILEVARNE LA PRESENZA.

SOLAMENTE NEI CASI DI PRESENZA DELL'INSETTO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**METOSSIFENOZIDE (INTREPID, PRODIGY)**  
**FLUFENOXURON (AGRIMIX FLUFEN 50 DC)**  
**TEBUFENOZIDE (CONFIRM, MIMIC, DEVOX)**

**TALE TRATTAMENTO, VISTO IL PERIODO, NON E' EFFICACE CONTRO CARPOCAPSA**





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (FINE CADUTA PETALI)

---

### OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO D'INFEZIONE, VISTE LE CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, SI CONSIGLIA DI AGGIUNGERE AL PRODOTTO ANTICICHIOLATURA UNO SPECIFICO ANTIOIDICO A BASE DI:

**QUINOXIFEN (ARIUS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)**

OPPURE

**ZOLFO (VARI)**

OPPURE

**BUPIRIMATE (NIMROD)**

## PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### CYDIA MOLESTA

CONTINUA IL MONITORAGGIO ATTRAVERSO LE TRAPPOLE A FEROMONI E IL CONTROLLO VISIVO SULLA VEGETAZIONE: PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO TRATTAMENTI SPECIFICI, SI CONSIGLIA DI CONSULTARE IL BOLLETTINO PRECEDENTE.

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

