



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 09

DATA 10/05/2011

MELO

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO ATTRAVERSO LE TRAPPOLE A FEROMONI CONTINUA A SEGNALARE LA PRESENZA DI ADULTI: PER LE AZIENDE CHE NON HANNO ANCORA EFFETTUATO IL TRATTAMENTO OVICIDA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, PRODIGY) (MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

RYNAXYPYR (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE

TEBUFENOZIDE (MIMIC)

(MASSIMO 4 INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE)

OPPURE UN FORMULATO AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)

OPPURE

CLOPPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

IL RISCHIO DI INFEZIONI PRIMARIE È ANCORA ATTIVO, PERTANTO SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA DELLA VEGETAZIONE IN CASO DI POSSIBILI PIOGGE, CON PRODOTTI A BASE DI:

MANCOZEB (DITHANE DG/M-45)

DITHIANON (DELAN WG)

OPPURE PRODOTTI A BASE DI

TRIFLOXISTROBIN (FLINT) (AL MASSIMO TRE INTERVENTI CON LE STROBILURINE: SI RICORDA CHE TALI PRODOTTI HANNO ANCHE ATTIVITA' ANTIOIDICA).

IN CASO DI PIOGGIA E' POSSIBILE INTERVENIRE ENTRO LE 96 ORE DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE CON **PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA IBE** (MICLOBUTANIL, FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, FENBUCONAZOLO, BITERTANOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO) **IN MISCELA CON I PRODOTTI DI COPERTURA.**

CILIEGIO (INVAIATURA)

MOSCA DEL CILIEGIO

VISTA LA FASE FENOLOGICA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE, IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA, CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX (TREBON) T.C. 7 GG.

OPPURE

TIAMETOXAM (ACTARA) T.C. 7 GG. (IL PRODOTTO NON PUÒ PIÙ ESSERE IMPIEGATO NEL CASO SIA GIÀ STATO EFFETTUATO UN TRATTAMENTO A BASE DI IMIDACLOPRID).

OPPURE

FOSMET (SPADA 200 EC) T.C. 10 GG.

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITA'





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA

IL MONITORAGGIO CON TRAPPOLE A FEROMONI SEGNALE UNA RIPRESA DEL VOLO: CONSIDERATE LE SOGLIE TERMICHE, E' CONSIGLIABILE INIZIARE AD UTILIZZARE I PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA.** .
PERTANTO, PER LE AZIENDE CHE INTENDONO ADOTTARE TALE STRATEGIA DI DIFESA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE VERSO LA FINE DELLA CORRENTE SETTIMANA CON PRODOTTI A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, PRODIGY) (MASSIMO 4 INTERVENTI)
OPPURE
CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

(I PRODOTTI INDICATI SONO ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)

OIDIO

NEI PESCHETI A RISCHIO D'INFEZIONE, VISTE LE CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, SI CONSIGLIA DI AGGIUNGERE ALL'INSETTICIDA UN PRODOTTO SPECIFICO ANTOIDICO A BASE DI:

QUINOXIFEN (ARIUS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)
OPPURE
ZOLFO (VARI)
OPPURE
BUPIRIMATE (NIMROD)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.
- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T O T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68).

