



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 02
26/03/2013

PESCO (BOTTONI ROSA)

BOLLA-CORINEO

PER LE AZIENDE CHE NON SONO ANCORA INTERVENUTE, SI RICORDA CHE È ANCORA POSSIBILE IN QUESTO PERIODO RINNOVARE LA COPERTURA (PER PRODOTTI DA IMPIEGARE, VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE)

COCCINIGLIA

PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO TRATTAMENTI, SI RICORDA CHE E' ANCORA POSSIBILE INTERVENIRE, IN SITUAZIONI DI FORTE INFESTAZIONE ED **ENTRO LA FASE DI BOTTONI ROSA**, CON PRODOTTI A BASE DI:

OLIO MINERALE (VARI) IN DOSI DI 2L./HL

IN CASO DI FORTI INFESTAZIONI EFFETTUARE LA MISCELA

PIRIPROXYFEN (JUVINAL, ADMIRAL) ALLA DOSE DI 0,32/L./HA + **OLIO MINERALE(VARI)** IN DOSI DI L1/HL

CANCRI RAMEALI

E' POSSIBILE EFFETTUARE UN TRATTAMENTO SPECIFICO IN PRE-FIORITURA CON PRODOTTI A BASE DI

TIOFANATE METILE (VARI) AL MASSIMO 1 INTERVENTO IN QUESTA FASE FENOLOGICA)

SI RICORDA CHE PER TALE TRATTAMENTO E' PREVISTA L'AUTORIZZAZIONE DEL TECNICO.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (BOTTONI ROSA)

ANARSIA

NELLE ZONE A RISCHIO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON **FLUVALINATE** (MAVRIK 20 EW, KLARTAN 20 EW).
AL MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO IN PRE-FIORITURA.
SI RICORDA CHE IL P.A. E' EFFICACE ANCHE CONTRO I TRIPIDI.

CILIEGIO-SUSINO (BOTTONI SEPARATI)

CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:
THIRAM (VARI)

ALBICOCCO (INIZIO FIORITURA)

MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI, E' STATA CONCESSA LA DEROGA DAL SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE PER INTERVENIRE IN FASE DI FIORITURA. SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,3 KG/HA)
CYPRODINIL (CHORUS)

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

MICLOBUTANIL *(THIOCUR FORTE)
FENBUCONAZOLO* (SIMITAR 5 EW)
TEBUCONAZOLO* (FOLICUR SE)
PROPICONAZOLO* (VARI)

(*I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI TRE VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (ROTTURA GEMME)

TICCHIOLATURA

LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE DI QUESTI GIORNI HANNO DETERMINATO IL RALLENTAMENTO DELLA FASE FENOLOGICA E QUNIDI UN CERTO RITARDO RISPETTO AL 2012. NON ESSENDO ANCORA NELLA FASE DI SENSIBILITA' AL PATOGENO, SI CONSIGLIA PERTANTO DI ATTENDERE LE INDICAZIONI DEI PROSSIMI BOLLETTINI.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.
- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

