



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 03
12/04/2013

PESCO (BOTTONI ROSA-FIORITURA)

BOLLA-CORINEO

PER LE AZIENDE CON VARIETÀ A FIORITURA TARDIVA, SI RICORDA CHE È ANCORA POSSIBILE, ENTRO LA FASE DI BOTTONI ROSA, RINNOVARE LA COPERTURA CON PRODOTTI A BASE DI:

ZIRAM (VARI) (LIMITAZIONE DI 3 KG/HA AD ECCEZIONE DEL F.C. TRISCABOL) OPPURE **TIRAM** (VARI - LIMITAZIONE PER F.C. POMARSOL 80WG: MASSIMO 3 KG/HA)

IN ALTERNATIVA TRA LORO E SONO *PREVISTI SOLO 2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI CON QUESTI PRODOTTI.*

OPPURE

CAPTANO (VARI). COMPLESSIVAMENTE AL MASSIMO 3 INTERVENTI CONTRO L'AVVERSITA'.

OPPURE

DODINA (VARI)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

SUSINO (INIZIO-FIORITURA)

MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI, E' STATA CONCESSA LA DEROGA DAL SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE PER INTERVENIRE IN FASE DI FIORITURA. SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,3 KG/HA)

CYPRODINIL (CHORUS)

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

MICLOBUTANIL *(THIOCUR FORTE)

FENBUCONAZOLO* (SIMITAR 5 EW)

TEBUCONAZOLO* (FOLICUR SE)

PROPICONAZOLO* (VARI)

(*I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI QUATTRO VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (ORECCHIETTE DI TOPO)

TICCHIOLATURA

DATA LA FASE FENOLOGICA, SIAMO NELLA CONDIZIONE DI RECETTIVITÀ VERSO IL PATOGENO: VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI:

DITHIANON (DELAN 70 WG)

OPPURE

PROPINEB (ANTRACOL 70 WG)(AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO ENTRO LA FASE DI CADUTA PETALI)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.
- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

