



Coldiretti Alessandria



COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 04
23/04/2013

PESCO-SUSINO (CADUTA PETALI)

AFIDI

PER LE AZIENDE CHE NON HANNO EFFETTUATO ANCORA TRATTAMENTI SPECIFICI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

IMIDACLOPRID* (CONFIDOR ETC..) EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO).

SI RICORDA CHE PER IL SUSINO IL PRODOTTO È EFFICACE ANCHE SU TENTREDINE

OPPURE

ACETAMIPRID* (EPIK)

OPPURE

THIAMETOXAM* (ACTARA)

(*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO)

PESCO-SUSINO-ALBICOCCO (CADUTA PETALI-SCAMICIATURA)

MONILIA

PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO, SI RICORDA CHE A CADUTA PETALI E' POSSIBILE EFFETTUARE UN INTERVENTO SPECIFICO CON PRODOTTI A BASE DI:

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)

CYPRODINIL (CHORUS)

BOSCALID (CANTUS)

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

OPPURE

MICLOBUTANIL *(THIOCUR FORTE)
FENBUCONAZOLO* (SIMITAR 5 EW)
TEBUCONAZOLO* (FOLICUR SE)
PROPICONAZOLO* (VARI)

(*I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI QUATTRO VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA'; MASSIMO TRE INTERVENTI ALL'ANNO SU ALBICOCCO)

MELO

(MAZZETTI SEPARATI-BOTTONI BIANCHI)

OIDIO

NELLE SITUAZIONI A RISCHIO (PRESENZA DI ATTACCHI LO SCORSO ANNO), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTIOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI)(IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)

OPPURE

QUINOXIFEN (ARIUS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

MELO

(MAZZETTI SEPARATI-BOTTONI BIANCHI)

AFIDI

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLUVALINATE (MAVRIK)(AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO)

FLONICAMID (TEPPEKI)(AL MASSIMO DUE TRATTAMENTI ALL'ANNO)

PIRIMICARB (PIRIMOR)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (MAZZETTI SEPARATI-BOTTONI BIANCHI)

TICCHIOLATURA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE INCERTE, CON POSSIBILI PIOGGE ANCHE NEI PROSSIMI GIORNI, SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON PRODOTTI A BASE DI:

PIRIMETANIL (SCALA) / CIPRODINIL (CHORUS) (CON ANILINOPIRIMIDINE MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(MICLOBUTANIL, FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)

IN MISCELA CON I PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI

DITHIANON (DELAN WG, KUKI WG, TIANON WG)

OPPURE

PROPINEB (ANTRACOL 70 WG)(MASSIMO 2 TRATTAMENTI/ANNO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

