




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 06

07/05/2013

MELO (FINE FIORITURA)

TICCHIOLATURA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE ANCORA INSTABILI, SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA (PER I PRODOTTI DA IMPIEGARE, VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE).

SUSINO (ALLEGAGIONE)

CYDIA FUNEBRANA

IL MODELLO MATEMATICO PREVEDE, NELLE ZONE PIU' PRECOCI, L'INIZIO DELL'OVIDEPOSIZIONE: NEI FRUTTETI DANNEGGIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI, E' POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTO AD AZIONE OVO-LARVICIDA A BASE DI:

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE

TRIFLUMURON (ALSYSTIN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

IN TUTTE LE ALTRE SITUAZIONI SI PREVEDE DI INTERVENIRE SULLA SECONDA GENERAZIONE.

TENTREDINE DEL SUSINO

IN SITUAZIONI A RISCHIO PER PRESENZA DI DANNI NELLE PASSATE STAGIONI, PER CHI NON AVESSE ANCORA FATTO INTERVENTI AFICIDI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

IMIDACLOPRID (CONFIDOR, ECC..)


AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO

EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO.





Coldiretti Alessandria



Soc. Coop. r.l.

Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

SUSINO (ALLEGAGIONE)

CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:
THIRAM (POMARSOL 80 WG)
(**MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO**)

PESCO (SCAMICIATURA-INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

IN CONSIDERAZIONE DEL MONITORAGGIO CON TRAPPOLE A FEROMONI E DEI MODELLI PREVISIONALI, NEI FRUTTETI A RISCHIO (PER PRESENZA DI DANNI NEGLI ANNI PRECEDENTI), E' CONSIGLIABILE INIZIARE AD UTILIZZARE I PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** PER LA FINE DELLA CORRENTE SETTIMANA, A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, PRODIGY) (MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE

TRIFLUMURON (ALSYSTIN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OIDIO

NELLE SITUAZIONI A RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE UN PRODOTTO SPECIFICO A BASE DI:

BUPIRIMATE (NIMROD)

OPPURE

ZOLFO BAGNABILE (VARI)

OPPURE


PROPICONAZOLO (VARI)

(SI RICORDA CHE IL P.A. HA AZIONE COLLATERALE ANCHE CONTRO LA BOLLA DEL PESCO)





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

PESCO

(SCAMICIATURA-INGROSSAMENTO FRUTTI)

BOLLA DEL PESCO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:
THIRAM (POMARSOL 80 WG)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

ALBICOCCO

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:
THIRAM (POMARSOL 80 WG) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
CAPTANO (MERPAN 80 WDG) (MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO, IN ALTERNATIVA A THIRAM)

CILIEGIO

(SCAMICIATURA)


CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:
THIRAM (VARI) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO ENTRO LA FASE DI SCAMICIATURA)





Coldiretti Alessandria



 Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO (SCAMICIATURA)

AFIDI

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

IMIDACLOPRID* (CONFIDOR) (EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO)

OPPURE

ACETAMIPRID* (EPIK)

OPPURE

THIAMETOXAM* (ACTARA)

(*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T O T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

