




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 07

16/05/2013

MELO

(ALLEGAGIONE-INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

IL PERDURARE DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE INSTABILI E LA DELICATA FASE FENOLOGICA, IMPONGONO LA MASSIMA ATTENZIONE VERSO LO SVILUPPO DELLE INFEZIONI.

IN CASO DI INTERVENTI SUCCESSIVI ALLE PIOGGE, SI RICORDA CHE E' POSSIBILE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE CON PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA

PIRIMETANIL (SCALA) / CIPRODINIL (CHORUS)

(CON ANILINOPIRIMIDINE MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE CON

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(MICLOBUTANIL, FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)

SI CONSIGLIA DI MISCELARE CON I PRODOTTI DI COPERTURA:

DITHIANON (DELAN WG, KUKI WG, TIANON WG)


OPPURE

PROPINEB (ANTRACOL 70 WG)(MASSIMO 2 TRATTAMENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

MELO

(ALLEGAGIONE-INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO TRAMITE LE TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI SEGNALANO LA PRESENZA DI ADULTI E L'INIZIO DELLA FASE DI OVIDEPOSIZIONE NEI MELETI IN FASE FENOLOGICA PIU' AVANZATA: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE APPENA POSSIBILE CON FORMULATI AD AZIONE **OVICIDA** A BASE DI:

TRIFLUMURON (ALSYSTIN)

NEL CASO NON SI RIESCA AD INTERVENIRE NEL BREVE PERIODO SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, PRODIGY) (MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

TEBUFENOZIDE (MIMIC) (MASSIMO 4 INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

SI RICORDA CHE TALI P.A. HANNO AZIONE ANCHE CONTRO I **TORTRICIDI RICAMATORI**

SUSINO

(ALLEGAGIONE)

CYDIA FUNEBRANA

COME GIA' INDICATO NEL BOLLETTINO PRECEDENTE, E' INIZIATA LA FASE DI OVIDEPOSIZIONE: NEI FRUTTETI DANNEGGIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI, E' ANCORA POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA A BASE DI:

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE


TRIFLUMURON (ALSYSTIN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

IN TUTTE LE ALTRE SITUAZIONI SI PREVEDE DI INTERVENIRE SULLA SECONDA GENERAZIONE.





Coldiretti Alessandria



Soc. Coop. r.l.



CIA Alessandria

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO SI RICORDA CHE E' ANCORA POSSIBILE UTILIZZARE I PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, PRODIGY) (MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE

TRIFLUMURON (ALSYSTIN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OIDIO-MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI METEO PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DEI PATOGENI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

MICLOBUTANIL *(THIOCUR FORTE)

FENBUCONAZOLO* (SIMITAR 5 EW)

PROPICONAZOLO* (VARI)

AZIONE COLLATERALE ANCHE SU BOLLA
(*CON IBE MASSIMO 4 INTERVENTI/ANNO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T O T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

