




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 08

28/05/2013

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIALATURA

IL PERDURARE DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE INSTABILI IMPONGONO LA MASSIMA ATTENZIONE VERSO LO SVILUPPO DELLE INFEZIONI.

IN CASO DI INTERVENTI SUCCESSIVI ALLE PIOGGE, SI RICORDA CHE E' POSSIBILE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE CON PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA

PIRIMETANIL (SCALA) / CIPRODINIL (CHORUS)
(CON ANILINOPYRIMIDINE MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE CON

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(MICLOBUTANIL, FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)


SI CONSIGLIA DI MISCELARE CON I PRODOTTI DI COPERTURA:

DITHIANON (DELAN WG, KUKI WG, TIANON WG)





Coldiretti Alessandria



Soc. Coop. r.l.

Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO TRAMITE LE TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI CONFERMANO LA PRESENZA DI ADULTI E L'AVANZAMENTO DELLA FASE DI OVIDEPOSIZIONE: SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE OVO-LARVICIDA A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, PRODIGY) (MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

TEBUFENOZIDE (MIMIC) (MASSIMO 4 INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

SI RICORDA CHE TALI P.A. HANNO AZIONE ANCHE CONTRO I **TORTRICIDI**
RICAMATORI

OIDIO

SI SEGNALANO INFEZIONI IN ATTO IMPORTANTI PER CUI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI)(IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)

OPPURE

QUINOXIFEN (ARIUS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)


OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

AL MOMENTO SIAMO NELLA FASE FINALE DELLA OVIDEPOSIZIONE PER CUI, NEI FRUTTETI DANNEGGIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO PRECEDENTEMENTE, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

FOSMET (SPADA) (TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

IN TUTTE LE ALTRE SITUAZIONI SI PREVEDE DI INTERVENIRE SULLA SECONDA GENERAZIONE.

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

BOLLA-CORINEO

SI SEGNALANO INFEZIONI IN CONTINUO SVILUPPO PER CUI SI CONSIGLIA DI RINNOVARE LA COPERTURA CON PRODOTTI A BASE DI:

DODINA (VARI)(AZIONE COLLATERALE SU MONILIA)

OPPURE

DITIANON (VARI)

CILIEGIO (INGROSSAMENTO FRUTTI INVAIATURA)

MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN FASE DI INVAIATURA (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX (TREBON) T.C. 7 GG.

OPPURE


FOSMET (SPADA 200 EC) T.C. 10 GG.

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITA'.





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.

OPPURE

PROPICONAZOLO (OPINION, ETC..) T.C. 14 GG.

(CON IBE MASSIMO 2 INT./ANNO SU CILIEGIO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) T.C.7 GG.

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T O T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

