




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 09

05/06/2013

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

CONTINUA L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ATTRAVERSO LE TRAPPOLE A FEROMONI, IL CONTROLLO VISIVO SULLA VEGETAZIONE ED I MODELLI PREVISIONALI: IN BASE ALLO SVILUPPO DELLA PRESENZA DI ADULTI, SIAMO NELLA FASE FINALE DELLA PRIMA GENERAZIONE PER CUI SI CONSIGLIA DI ATTENDERE LE INDICAZIONI DEI PROSSIMI BOLLETTINI.

ANARSIA

I DATI RELATIVI AL MONITORAGGIO CON TRAPPOLE A FEROMONI INDICANO UN AUMENTO DELLA PRESENZA DELL'INSETTO PER CUI, IN SITUAZIONI DI DANNI NEGLI ANNI PRECEDENTI SI CONSIGLIA DI CONSULTARE I TECNICI AL FINE DI VALUTARE LA CORRETTA STRATEGIA DI DIFESA INSETTICIDA.

OIDIO

VISTE LE CONDIZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI UNIRE AI TRATTAMENTI INSETTICIDI UN ANTIOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

QUINOXYFEN (ARIUS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

OPPURE

ZOLFO BAGNABILE (VARI)





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

SI SEGNALANO INFEZIONI IN ATTO: IN FUNZIONE DELLE PREVISIONI METEOROLOGICHE (PIOGGE O BAGNATURE FOGLIARI PROLUNGATE) SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI:

DITHIANON (DELAN WG, ...)

OPPURE

FLUAZINAM (OHAYO) T.C. 60 GG.

OPPURE

CAPTANO (MERPAN 80 WDG) (MASSIMO 3 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

DODINA (VARI) (SOLO SU VARIETA' RED DELICIOUS/FUJI)

IN PRESENZA DI DEBOLI INFEZIONI (INFERIORI AL 2%), E' POSSIBILE UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI:

ZOLFO BAGNABILE - TIOPRON

CARPOCAPSA

IN FUNZIONE DEI MONITORAGGI CON TRAPPOLE A FEROMONI E DEI MODELLI PREVISIONALI, PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO, SI CONSIGLIA DI TRATTARE CON FORMULATI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, PRODIGY) (MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

TEBUFENOZIDE (MIMIC) (MASSIMO 4 INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

SI RICORDA CHE TALI P.A. HANNO AZIONE ANCHE CONTRO I **TORTRICIDI RICAMATORI**





Coldiretti Alessandria



Soc. Coop. r.l.

Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

OIDIO

SI CONFERMA LA PRESENZA DI INFEZIONI IN ATTO PER CUI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTIROIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI)(IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)

OPPURE

QUINOXIFEN (ARIUS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

CILIEGIO (INVAIATURA)

MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN FASE DI INVAIATURA (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX (TREBON) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA 200 EC) T.C. 10 GG.

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITA'.





Coldiretti Alessandria



Soc. Coop. r.l.

Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO (INVAIATURA)

MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN PRE-RACCOLTA (IN FUNZIONE DELLA VARIETA') CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.

OPPURE

PROPICONAZOLO (OPINION, ETC..) T.C. 14 GG.

(CON IBE MASSIMO 2 INT./ANNO SU CILIEGIO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) T.C.7 GG.

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

