




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 10

12/06/2013

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

I DATI RELATIVI AL MONITORAGGIO ATTRAVERSO LE TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI INDICANO CHE, A SECONDA DELLE POSIZIONI (PRECOCI O TARDIVE), SIAMO **NELLA FASE INIZIALE DELLA II GENERAZIONE** OPPURE (NELLE TARDIVE) NELLA FASE FINALE DELLA I GENERAZIONE: A SECONDA DELLA SITUAZIONE, E' CONSIGLIABILE INIZIARE AD UTILIZZARE I PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** PER LA FINE DELLA CORRENTE SETTIMANA, A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, PRODIGY) (MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE

TRIFLUMURON (ALSYSTIN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

ANARSIA

I DATI RELATIVI AL MONITORAGGIO CON TRAPPOLE A FEROMONI INDICANO UN AUMENTO DELLA PRESENZA DELL'INSETTO.

OIDIO

VISTE LE CONDIZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI UNIRE AI TRATTAMENTI INSETTICIDI UN ANTIOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

QUINOXYFEN (ARIUS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)


OPPURE

ZOLFO BAGNABILE (VARI)





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

SI SEGNALANO INFEZIONI IN ATTO: IN FUNZIONE DELLE PREVISIONI METEOROLOGICHE (PIOGGE O BAGNATURE FOGLIARI PROLUNGATE) SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI:

DITHIANON (DELAN WG, ...)

OPPURE

FLUAZINAM (OHAYO) T.C. 60 GG.

OPPURE

CAPTANO (MERPAN 80 WDG) (MASSIMO 3 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

DODINA (VARI) (SOLO SU VARIETA' RED DELICIOUS/FUJI)

IN PRESENZA DI DEBOLI INFEZIONI (INFERIORI AL 2%), E' POSSIBILE UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI:

ZOLFO BAGNABILE - THIOPRON

CARPOCAPSA

I MONITORAGGI CON TRAPPOLE A FEROMONI INDICANO PRESENZA DEL'INSETTO ELEVATA (IN RIFERIMENTO AGLI ALTRI ANNI) PER CUI, PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO, OPPURE IN PRESENZA DI DANNI GIA' VISIBILI IN QUESTA FASE, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE AL PIU' PRESTO CON FORMULATI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

CLORPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX) (AL MASSIMO 2 INT./ANNO)


OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO)





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

OIDIO

SI CONFERMA LA PRESENZA DI INFEZIONI IN ATTO PER CUI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTI-OIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI)(IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)

OPPURE

QUINOXIFEN (ARIUS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)


AFIDI

SI SEGNA LA PRESENZA SPORADICA DI COLONIE DI AFIDE GRIGIO E LANIGERO: SI CONSIGLIA DI CONTATTARE I TECNICI PER EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI.





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO (PRE-RACCOLTA)

MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA È POSSIBILE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AL LORO TEMPO DI CARENZA, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR) T.C.3 GG.

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.

(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

SI RICORDA CHE CONTRO L'AVVERSITA' E' POSSIBILE FARE AL MASSIMO 4 INTERVENTI

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T O T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

