




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 11

18/06/2013

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

I DATI RELATIVI AL MONITORAGGIO ATTRAVERSO LE TRAPPOLE A FEROMONI INDICANO UN AUMENTO GENERALIZZATO DELLE CATTURE A CONFERMA CHE SIAMO **NELLA FASE INIZIALE DELLA II GENERAZIONE**: SI CONSIGLIA ANCORA DI UTILIZZARE I PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, PRODIGY) (MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE

TRIFLUMURON (ALSYSTIN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

ANARSIA

I DATI RELATIVI AL MONITORAGGIO CON TRAPPOLE A FEROMONI INDICANO UN AUMENTO DELLA PRESENZA DELL'INSETTO.

OIDIO

VISTE LE CONDIZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI UNIRE AI TRATTAMENTI INSETTICIDI UN ANTIOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

QUINOXYFEN (ARIUS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)


OPPURE

ZOLFO BAGNABILE (VARI)





Coldiretti Alessandria



Soc. Coop. r.l.

Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

SOLAMENTE IN PREVISIONE DI PIOGGE O BAGNATURE FOGLIARI PROLUNGATE SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI:

DITHIANON (DELAN WG, ...)

OPPURE

FLUAZINAM (OHAYO) T.C. 60 GG.

OPPURE

CAPTANO (MERPAN 80 WDG) (MASSIMO 3 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

DODINA (VARI) (SOLO SU VARIETA' RED DELICIOUS/FUJI)

IN PRESENZA DI DEBOLI INFEZIONI (INFERIORI AL 2%), E' POSSIBILE UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI:

ZOLFO BAGNABILE - THIOPRON

CARPOCAPSA

I MONITORAGGI CON TRAPPOLE A FEROMONI INDICANO CHE SIAMO NELLA FASE FINALE DELLA I° GENERAZIONE: IN PRESENZA DI DANNI GIA' VISIBILI IN QUESTA FASE, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE AL PIU' PRESTO CON FORMULATI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

CLORPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX) (AL MASSIMO 2 INT./ANNO)


OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO)





Coldiretti Alessandria



 Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

OIDIO

SI CONFERMA LA PRESENZA DI INFEZIONI IN ATTO PER CUI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTI-OIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI)(IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)

OPPURE

QUINOXIFEN (ARIUS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)


AFIDI

SI SEGNA LA PRESENZA SPORADICA DI COLONIE DI AFIDE GRIGIO E LANIGERO: SI CONSIGLIA DI CONTATTARE I TECNICI PER EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI.





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO (PRE-RACCOLTA)

MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA È POSSIBILE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AL LORO TEMPO DI CARENZA, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR) T.C.3 GG.

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.

(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

SI RICORDA CHE CONTRO L'AVVERSITA' E' POSSIBILE FARE AL MASSIMO 4 INTERVENTI

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T O T+) CON FRASI

DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

