




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 13

03/07/2013

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

SIAMO NELLA FASE LARVICIDA AVANZATA DELLA II GENERAZIONE PER CUI, PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO OPPURE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI **(ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA)**:

CLOPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (2 INT./ANNO) T.C. 15 GG

OPPURE

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 7 GG

OPPURE

SPINOSAD (LASER) T.C. 7 GG. (MASSIMO 3 INT./ANNO)

OPPURE

INDOXACARB (STEWART) T.C. 7 GG. (MASSIMO 2 INT./ANNO)

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) T.C. 7 GG (MASSIMO 2 INT./ANNO)

OPPURE

FOSMET (SPADA) (2 INT./ANNO) T.C.28 GG

OIDIO

VISTE LE CONDIZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI UNIRE AI TRATTAMENTI INSETTICIDI UN ANTIOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

QUINOXYFEN (ARIUS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)


OPPURE

ZOLFO BAGNABILE (VARI)





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

NEI FRUTTETI CHE SI TROVANO IN ASSENZA DI MACCHIE, SI POSSONO SOSPENDERE GLI INTERVENTI ANTI-TICCHIOLATURA.

IN PRESENZA DI INFEZIONI IN ATTO E SOLAMENTE IN PREVISIONE DI PIOGGE O BAGNATURE FOGLIARI PROLUNGATE SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON:

DITHIANON (DELAN WG, ...)

OPPURE

FLUAZINAM (OHAYO) T.C. 60 GG.

OPPURE

CAPTANO (MERPAN 80 WDG) (MASSIMO 3 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

DODINA (VARI) (SOLO SU VARIETA' RED DELICIOUS/FUJI)

IN PRESENZA DI DEBOLI INFEZIONI (INFERIORI AL 2%), E' POSSIBILE UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI:

ZOLFO BAGNABILE - THIOPRON

CARPOCAPSA

NEI MELETI IN FASE FENOLOGICA PIU' AVANZATA SIAMO NELLA FASE INIZIALE DI OVIDEPOSIZIONE (II GENRAZIONE): SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, PRODIGY) (MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

TEBUFENOZIDE (MIMIC) (MASSIMO 4 INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OIDIO

LE CONDIZIONI METEO SONO MOLTO FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI: NEI MELETI A RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI AGGIUNGERE UN PRODOTTO SPECIFICO ANTIOIDICO A BASE DI:

QUINOXIFEN (ARIUS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO) T.C 14 GG

OPPURE

ZOLFO (VARI) T.C. 5 GG.


OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD) T.C.21 GG.





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO-PESCO (PRE-RACCOLTA)

MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA È POSSIBILE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AL LORO TEMPO DI CARENZA, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR) T.C.3 GG.

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.

(CON IBE MAX 4 INT./ANNO SU PESCO E 3 INT./ANNO SU ALBICOCCO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

SI RICORDA CHE CONTRO L'AVVERSITA' E' POSSIBILE FARE AL MASSIMO 4 INTERVENTI

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T O T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

