




Coldiretti Alessandria



Volpedo Frutta
Soc. Coop. r.l.
Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 14

17/07/2013

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

IN PRESENZA DI PUNTE CIDIATE E QUINDI DI ATTTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** (**VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE**), TENENDO IN CONSIDERAZIONE CHE DALLA PROSSIMA SETTIMANA SI PREVEDE L'INIZIO DELLA TERZA GENERAZIONE E QUINDI VERRA' CONSIGLIATO D' INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA.

OIDIO

VISTE LE CONDIZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI UNIRE AI TRATTAMENTI INSETTICIDI UN ANTIOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

QUINOXYFEN (ARIUS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

OPPURE

ZOLFO BAGNABILE (VARI)

MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA È POSSIBILE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AL LORO TEMPO DI CARENZA, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR) T.C.3 GG.

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.

(CON IBE MAX 4 INT./ANNO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE


BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

SI RICORDA CHE CONTRO L'AVVERSITA' E' POSSIBILE FARE AL MASSIMO 4 INTERVENTI





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

SI CONFERMA CHE SIAMO NELLA FASE INIZIALE DELLA II GENERAZIONE: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE OVO-LARVICIDA A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, PRODIGY) (MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

TEBUFENOZIDE (MIMIC) (MASSIMO 4 INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OIDIO

LE CONDIZIONI METEO SONO MOLTO FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI: NEI MELETI A RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI AGGIUNGERE UN PRODOTTO SPECIFICO ANTOIDICO A BASE DI:

QUINOXIFEN (ARIUS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO) T.C 14 GG

OPPURE

ZOLFO (VARI) T.C. 5 GG.


OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD) T.C.21 GG.





Coldiretti Alessandria



 Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI E NEI FRUTTETI DANNEGGIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T O T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

