




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 15

23/07/2013

### PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

#### CYDIA MOLESTA

IL MONITORAGGIO TRAMITE TRAPPOLE A FEROMONI EVIDENZIA AUMENTO DELLE CATTURE ED I MODELLI PREVISIONALI INDICANO CHE SIAMO ALL'INIZIO DELLA TERZA GENERAZIONE: SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE I PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA) A BASE DI:

**METOSSIFENOZIDE** T.C. 7GG (INTREPID, PRODIGY) (MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

**CLORANTRANILIPROLE** T.C. 14 GG (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE

**TRIFLUMURON** T.C. 14 GG (ALSYSTIN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

IN ALTERNATIVA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI **AD AZIONE LARVICIDA**

#### OIDIO

SI SEGNALANO INFEZIONI IN ATTO ED IN CONTINUO SVILUPPO: SI CONSIGLIA DI UNIRE AI TRATTAMENTI INSETTICIDI UN ANTIODIDICO SPECIFICO A BASE DI:

**QUINOXYFEN** (ARIUS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

**BUPIRIMATE** (NIMROD)


OPPURE

**ZOLFO BAGNABILE** (VARI)





Coldiretti Alessandria



**Confagricoltura**  
Alessandria



CIA Alessandria

## PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA È POSSIBILE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AL LORO TEMPO DI CARENZA, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:  
**FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR) T.C.3 GG.**

OPPURE

**TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.**

(CON IBE MAX 4 INT./ANNO)

OPPURE

**FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

OPPURE

**BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**

**SI RICORDA CHE CONTRO L'AVVERSITA' E' POSSIBILE FARE AL MASSIMO 4 INTERVENTI**

## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### CARPOCAPSA

I MONITORAGGI CON TRAPPOLE A FEROMONI INDICANO SCARSO SVILUPPO DELL'INSETTO; **IN PRESENZA DI DANNI VISIBILI** IN QUESTA FASE, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE AL PIÙ PRESTO CON FORMULATI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

**CLOPPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX) (AL MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 30 GG**

OPPURE

**CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.)(3 INT./ANNO) T.C. 15 GG**

OPPURE

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)(AL MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 7 GG.**


OPPURE

**FOSMET (SPADA) (MASSIMO 3 INT./ANNO) T.C 14 GG.**





Coldiretti Alessandria



 Confagricoltura  
Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI AGGIUNGERE UN PRODOTTO SPECIFICO ANTIROIDICO A BASE DI:

**QUINOXIFEN (ARIUS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO) T.C 14 GG**

OPPURE

**ZOLFO (VARI) T.C. 5 GG.**

OPPURE

**BUPIRIMATE (NIMROD) T.C.21 GG.**

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA

STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASI

DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

