




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 16

30/07/2013

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** (VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE) SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (2 INT./ANNO) T.C. 15 GG

OPPURE

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 7 GG

OPPURE

SPINOSAD (LASER)(3 INT./ANNO) T.C. 7 GG

OPPURE

INDOXACARB (2 INTERV./ANNO)(STEWART) T.C. 7 GG

OPPURE

BACILLUS THURINGENSIS (VARI) T.C. 3 GG

OPPURE

FOSMET (SPADA) (2 INT./ANNO) T.C.28 GG

OIDIO

SI SEGNALANO INFEZIONI IN ATTO ED IN CONTINUO SVILUPPO: SI CONSIGLIA DI UNIRE AI TRATTAMENTI INSETTICIDI UN ANTIODIDICO SPECIFICO A BASE DI:

QUINOXYFEN (ARIUS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)T.C. 14 GG

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD) T.C. 14 GG.

OPPURE

ZOLFO BAGNABILE (VARI)





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER
ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, IN PROSSIMITÀ DELLA
RACCOLTA È POSSIBILE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AL LORO
TEMPO DI CARENZA, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR) T.C.3 GG.

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.

OPPURE

DIFENOCONAZOLO (SCORE) T.C. 7 GG.

(CON IBE MAX 4 INT./ANNO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

**SI RICORDA CHE CONTRO L'AVVERSITA' E' POSSIBILE FARE AL MASSIMO 4
INTERVENTI**

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

IN PRESENZA DI DANNI VISIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON
FORMULATI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.)(3 INT./ANNO) T.C. 15 GG

OPPURE

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)(AL MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO 3 INT./ANNO) T.C 14 GG.

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (MAX 1 INT/ANNO IN PRE-RACCOLTA) T.C. 7GG





Coldiretti Alessandria



 Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI AGGIUNGERE UN PRODOTTO SPECIFICO ANTIROIDICO A BASE DI:

QUINOXIFEN (ARIUS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO) T.C 14 GG

OPPURE

ZOLFO (VARI) T.C. 5 GG.

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD) T.C.21 GG.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA

STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T O T+) CON FRASI

DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

