



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 17

04/09/2013

PESCO (FINE RACCOLTA)

RAGNETTO

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN POST RACCOLTA CON PRODOTTI A BASE DI:

TEBUFENPYRAD (OSCAR) T.C. 14 GG

OPPURE

PIRIDABEN (NEXTER) T.C. 14 GG

OPPURE

ACEQUINOCYL (KANEMITE) T.C. 14 GG

AL MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO

SUSINO (PRE-RACCOLTA)

CYDIA FUNEBRANA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.


OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

SUSINO (PRE-RACCOLTA)

MONILIA

IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA È POSSIBILE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE AL LORO TEMPO DI CARENZA, INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR) T.C.3 GG.

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.

(CON IBE MAX 4 INT./ANNO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

SI RICORDA CHE CONTRO L'AVVERSITA' E' POSSIBILE FARE AL MASSIMO 4 INTERVENTI

MELO (PRE-RACCOLTA)

CARPOCAPSA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI (SOGLIA OLTRE IL 2%) SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.)(3 INT./ANNO) T.C. 15 GG

OPPURE

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM)(AL MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO 3 INT./ANNO) T.C 14 GG.

OPPURE

SPINOSAD (LASER) (MASSIMO 3 INT/ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE


ETOFENPROX (TREBON) (MAX 1 INT/ANNO IN PRE-RACCOLTA) T.C. 7GG

SI RICORDA CHE I PRODOTTI SONO EFFICACI ANCHE CONTRO LA CYDIA DEL PESCO





Coldiretti Alessandria



Soc. Coop. r.l.

Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

MELO (PRE-RACCOLTA)

BUTTERATURA AMARA

NEI MELETI SOGGETTI A TALE FISIOPATIA, SI CONSIGLIA DI INTERVENTI CON PRODOTTI A BASE DI **CALCIO**

MARCIUMI

PER PREVENIRE LO SVILUPPO DI FUNGHI CHE CAUSANO MARCIUMI DEI FRUTTI DURANTE LA FASE DI CONSERVAZIONE, È CONSIGLIABILE EFFETTUARE UN INTERVENTO CON FORMULATI A BASE DI:

CAPTANO (MERPAN 80 WDG)(AL MASSIMO 3 INT./ANNO) T.C. 21 GG

OPPURE

BOSCALID + PYRACLOSTRBIN (BELLIS) (AL MASSIMO 3 INT./ANNO) T.C. 7 GG

OPPURE

FLUDIOXONIL (GEOXE)(AL MASSIMO 1 INT./ANNO) T.C. 7 GG

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T O T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

