



**Aggiornamento corilicolo del 20 marzo 2013.
PSR Regione Piemonte Misura 114**

COCCINIGLIA

In alcuni sopralluoghi abbiamo riscontrato attacchi di cocciniglia. Dove la vegetazione non è ancora sviluppata è consigliabile appena le condizioni meteo lo permettano, intervenire al fine di contenere gli attacchi di cocciniglia ben visibile sui rametti. Si invitano le aziende a segnalare i nocciolieti colpiti da cocciniglia.

E' consigliabile contattare i tecnici per verificare l'effettiva necessità dell'intervento e per definire i prodotti da utilizzare.



Eriofide

Continuano le segnalazioni di noccioleti colpiti da attacchi di eriofide (*Phytoptus avellanae*) sia in impianti produttivi, ma soprattutto molto i noccioleti giovani. L'andamento climatico anomalo delle ultime stagioni, l'impossibilità di utilizzare vecchi prodotti come l'endosulfan, hanno reso la lotta contro questo acaro molto più impegnativa. Nei prossimi giorni i tecnici inizieranno il monitoraggio della migrazione dell'eriofide al fine di individuare il momento migliore per intervenire. Appena le condizioni meteo lo permetteranno, con l'innalzamento delle temperature, soprattutto nelle zone più anticipate, occorrerà intervenire tempestivamente per cercare di limitare il diffondersi della malattia.



La difesa fitosanitaria è caratterizzata da un tempestivo intervento nell'inizio della migrazione dell'acaro e una ripetizione dopo **8-10 giorni**.

Si consiglia di effettuare il trattamento in assenza di vento, con temperature e volumi di acqua idonei controllando periodicamente lo stato di avanzamento della migrazione dell'eriofide sui rametti.

Gianluca Griseri

Responsabile tecnico

349-2226026

serviziotecnico@ascopiemonte.it