



## ***Nocciolo***

***Bollettino tecnico 28/03/2011.***

### **COCCINIGLIA**

In alcuni sopralluoghi abbiamo riscontrato attacchi di cocciniglia. Dove la vegetazione non è ancora sviluppata e consigliabile intervenire con :

- **OLIO MINERALE**
- **POLITHIOL** ( 5 litri x 100 litri d'acqua)

**E' consigliabile contattare i tecnici per verificare l'effettiva necessità e fattibilità dell'intervento.**

### **ERIOFIDE**

Le abbondanti piogge dei giorni scorsi e le alte temperature per il periodo hanno favorito lo sviluppo della vegetazione. Attualmente ci troviamo per le zone più precoci dell'alessandrino nella fase di germogliamento con 2-3 foglioline già ben evidenti.



---

**Ascopiemonte s.c.**  
**Organizzazione Produttori Frutta a Guscio**

---



In molte zone, complice l'alta, le gemme ingrossate iniziano ad aprirsi favorendo così la migrazione.

E' opportuno quindi intervenire con un primo trattamento tra la fine del mese di marzo e la prima settimana di aprile con:

- **ZOLFO BAGNABILE** con le diverse formulazioni in commercio.
- **THIOPRON ( 10-12 litri x 1000 litri di acqua).**

Occorre poi ripetere il trattamento tenendo conto delle temperature e di eventuali precipitazioni, dopo 12-15 giorni dal precedente utilizzando:

- **NUOVAMENTE ZOLFO BAGNABILE O THIOPRON**
- **ZOLFO IN POLVERE**

S. Stefano Belbo, 28 marzo 2011

Responsabile tecnico  
Gianluca Griseri