

Info n. 12
Del 20/06/2018



Coordinamento Corilicolo Piemontese

AGGIORNAMENTO TECNICO

Situazione trappole e frappe

Deroga EPIK SL

Prodotti “alternativi”: efficacia da verificare

Fase fenologica: ingrossamento frutticini all'interno della nucola (di seguito alcune immagini riferite allo stadio di sviluppo frutticini in diversi areali corilicoli):



Situazione trappole e frappege .

Monitoraggio con trappole:

In generale, le catture sono **IN DIMINUZIONE** in tutte le zone, comprese quelle in cui lo scorso anno, nella stessa epoca, erano particolarmente elevate (monregalese, carruccese). In alcune aree (fossanese, astigiano, alessandrino e Vercelli-Biella) si segnalano anche catture delle prime forme giovanili mentre nelle zone di S. Stefano Belbo e Cossano Belbo sono stati presi pochi individui adulti.

Monitoraggio con frappe:

Dai campionamenti (frappe) effettuati in questi giorni risulta:

Zona Monregalese: **poche catture** specialmente di cimice asiatica e presenza di diversi campioni negativi (nessuna cattura).

Alta Langa (Cortemilia, Cravanzana, Perletto ecc.): presenza di altre cimici (*G.acuteangulatus*), **sotto la soglia di intervento**, agrilo e balanino, ma poca *Halyomorpha halys*.

Albese: prime catture di *H.halys* (adulti e neanidi).

Alessandrino e Borgo d'Ale: catture di *G.acuteangulatus*, agrilo, balanino e *Halyomorpha halys*.

In considerazioni dei risultati ottenuti, si consiglia:

- **NELLA MAGGIORANZA DELLE REALTA' PRODUTTIVE CORILICOLE NON E' ANCORA IL MOMENTO DI INTERVENIRE CONTRO LE CIMICI. SI RICORDA CHE I P.A. INSETTICIDI NON HANNO ALCUNA EFFICACIA PREVENTIVA;**
- **INTENSIFICARE I CONTROLLI VISIVI ED I FRAPPAGE;**
- **ESCLUSIVAMENTE IN ALCUNE** zone dell'**Alessandrino** ed a **Borgo d'Ale**, in base alle segnalazioni di catture avute dai tecnici, si consiglia di effettuare un trattamento per il contenimento di *Halyomorpha halys*.

I prodotti utilizzabili su nocciòlo per contenere le cimici sono indicati nella tabella in allegato.

Deroga EPIK SL

Si ricorda che il formulato commerciale **EPIK SL** (s.a.acetamiprid –Società SIPCAM) è stato autorizzato, in deroga alle Norme Tecniche di Produzione Integrata Regione Piemonte, per il periodo **13/06/2018 -10/10/2018** per **n° 1 trattamento/anno** su *Halyomorpha halys* (**tempo di carenza di 60 giorni**).

Prodotti “alternativi”: efficacia da verificare

Sul mercato vengono proposti prodotti “alternativi” (repellenti, concimi, additivi etc) i quali, a detta delle società distributrici, dovrebbero svolgere un'azione di controllo sulla Cimice asiatica.

All'attuale stato, Agrion ha effettuato prove di efficacia esclusivamente sui prodotti registrati come agrofarmaci (vedi tabella allegata) mentre su questo genere di prodotti, per i quali richiede un tipo di valutazione più complesso, si prevede l'attuazione di prove di efficacia nel corso di questa stagione.

In conclusione, A TUTT'OGGI NON SONO DISPONIBILI PROVE TECNICHE CHE ABBIANO DIMOSTRATO L'EFFICACIA DI QUESTI PRODOTTI.