

Info n. 01
Del 22/03/2018

NOCCIOLO



Coordinamento Tecnici di base

AGGIORNAMENTO TECNICO

Completate le fioriture della Tonda Gentile Trilobata

Nevicata: interessati i corileti di media e alta collina

Cimice Asiatica: avviare i controlli delle teche di svernamento

Completate le fioriture della Tonda Gentile Trilobata

I rilievi eseguiti nelle zone di pianura, fondovalle e alta collina dell'albese indicano che è completata la fase di fioritura delle gemme femminili così come gli ammenti delle selvaggiole e delle cultivar impollinatrici. E' altresì a buon punto il grado di soddisfacimento in freddo (fabbisogno in freddo). Considerato lo stadio fisiologico delle piante il paventato ritorno di freddo atteso per fine settimana non provocherà danno alle coltivazioni corilicole.

Nevicata: interessati i corileti di media e alta collina

Le nevicata che hanno interessato nelle ultime settimane prevalentemente le località di media e alta collina delle province di Cuneo e Asti hanno provocato lo schianto o la fessurazione di un considerevole numero di pertiche in particolare dei corileti dove la potatura si limita all'eliminazione, tardo primaverile, delle pertiche rinsecchite.

Consigliamo, quando sia possibile accedere a piedi nei corileti, di provvedere con sollecitudine all'eliminazione di queste "ferite" e di procedere alla copertura dei tagli con mastici cicatrizzanti o preparati coprenti non filmogeni.



Cimice Asiatica: avvio dei controlli delle scatole di svernamento

Sulla scorta dell'attività avviata nella precedente annata agraria, sono state attivate postazioni di controllo per verificare l'inizio attività degli adulti di Cimice asiatica catturati nel mese gennaio nei sacchi messi sulle piante di nocciolo nella scorsa a.a., negli anfratti e nei naturali siti di svernamento. Nel 2018, a buona parte delle postazioni attivate nella Provincia di Cuneo si sono aggiunte quelle localizzate nelle Province di Asti ed Alessandria. Pur essendo molto in anticipo rispetto alla precedente a.a. (il 27 marzo del 2017, sulla base delle segnalazioni e dei rilievi dei Tecnici del coordinamento corilicolo, avevamo emesso il primo avviso di intervento Eriofide per le zone anticipate), nei pochissimi giorni, del primo trimestre dell'anno, in cui la temperatura si sono "alzate", le cimici asiatiche hanno dato timidi, ma "certi", segni di vitalità.

