



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 01
02/03/2016

PESCO
(GEMMA RIGONFIA)

BOLLA

SIAMO NELLA FASE DI RIPRESA VEGETATIVA PER CUI SI RICORDA CHE, VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI AD INFEZIONI, E' NECESSARIO INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ZIRAM(VARI)(MASSIMO 3 KG/HA)(MAX UN INTERVENTO ALL'ANNO)

OPPURE

TIRAM (VARI – MASSIMO 3 KG/HA)(MAX 2 INTERVENTI ALL'ANNO)

OPPURE

CAPTANO (VARI) , MAX. 2 INTERVENTI/ANNO

N.B. TRA TIRAM-ZIRAM-CAPTANO AL MASSIMO 3 INTERVENTI CONTRO L'AVVERSITA'.

OPPURE

DODINA (VARI) MAX. 2 INTERVENTI/ANNO

SI RICORDA CHE I FORMULATI INDICATI HANNO EFFICACIA ANCHE PER IL CORINEO

CANCRI RAMEALI

ENTRO LA FASE FENOLOGICA DI PRE-FIORITURA, PER I PESCHETI A RISCHIO E' CONSIGLIATO EFFETTUARE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL TECNICO, UN TRATTAMENTO SPECIFICO CON PRODOTTI A BASE DI:

TIOFANATE METILE (VARI)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (GEMMA RIGONFIA)

COCCINIGLIA

E' POSSIBILE INTERVENIRE IN SITUAZIONI DI FORTE INFESTAZIONE, ENTRO LA FASE DI GEMMA RIGONFIA, CON PRODOTTI A BASE DI:
OLIO BIANCO (VARI) IN DOSI DI 1,5-2 KG/HL

ALBICOCCO-SUSINO-CILIEGIO (GEMMA RIGONFIA - PRE-FIORITURA)

MONILIA

VISTE LA FASE FENOLOGICA E LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,3 KG/HA)

OPPURE

CYPRODINIL (CHORUS)

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR SE)(AL MASSIMO DUE INTERVENTI)

OPPURE

PROPICONAZOLO (VARI)(AL MASSIMO DUE INTERVENTI)

(I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI TRE VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO GEMME)

TICCHIOLATURA E CANCRI RAMEALI

IN QUESTA FASE FENOLOGICA E' CONSIGLIATO EFFETTUARE UN TRATTAMENTO SPECIFICO CON PRODOTTI A BASE DI:

RAME (VARI) (LIMITE DI 6 KG/HA SI S.A. ALL'ANNO)

MELO (INGROSSAMENTO GEMME)

COCCINIGLIA

IL TRATTAMENTO E' CONSIGLIATO SE NON SONO STATI EFFETTUATI TRATTAMENTI SPECIFICI NELL'AUTUNNO PRECEDENTE ED IN PARTICOLARE SE SI E' RISCONTRATA LA PRESENZA DEGLI SCUDETTI SUL LEGNO DI POTATURA.

OLIO BIANCO (VARI)

OLIO BIANCO + ZOLFO (POLITHIOL: SI RACCOMANDA DI EFFETTUARE IL TRATTAMENTO IN ASSENZA DI VEGETAZIONE)

ANTONOMO

NEGLI IMPIANTI A RISCHIO (ZONE COLLINARI VICINO AI BOSCHI) ED IN CONDIZIONI DI RIALZO DELLE TEMPERATURE, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE I MONITORAGGI ED EVENTUALMENTE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FOSMET (SPADA WDG, ETC..)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistono diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

