



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 04
13/04/2016

ALBICOCCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

MONILIA

PER LE AZIENDE CHE NON SONO ANCORA RIUSCITE AD INTERVENIRE CON PRODOTTI SPECIFICI, OPPURE IN CASI DI CULTIVAR SENSIBILI, SI CONSIGLIA UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI:

***CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,3 KG/HA)**

OPPURE

***CYPRODINIL (CHORUS)**

(*COMPLESSIVAMENTE AL MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL' AVVERSITÀ)

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW)(MASSIMO TRE INTEVENTI)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR SE)(AL MASSIMO DUE INTERVENTI)

OPPURE

PROPICONAZOLO (VARI)(AL MASSIMO DUE INTERVENTI)

OIDIO

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI, SI CONSIGLIA UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI:

QUINOXIFEN* (ARIUS) (*MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

ZOLFO (VARI)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

CAPTANO(VARI)(MAX 1 INTERVENTO ALL'ANNO)

OPPURE

**TIRAM (VARI – MASSIMO 3 KG/HA)(MAX 2 INTERVENTI ALL'ANNO;
TIRAM+CAPTANO AL MASSIMO 2 INTERVENTI)**

GEOMETRIDI

SI SEGNALANO ATTACCHI SPORADICI: IN TALI SITUAZIONI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

BACILLUS THURINGENSIS (VARI)

PESCO (CADUTA PETALI-SCAMICIATURA)

OIDIO

NELLE SITUAZIONI A RISCHIO D'INFEZIONE, O SU CULTIVAR SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE UN PRODOTTO SPECIFICO A BASE DI:

QUINOXIFEN* (ARIUS) (*MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

OPPURE

ZOLFO BAGNABILE (VARI)

OPPURE

PROPICONAZOLO (VARI)(AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO; SI RICORDA CHE IL P.A. HA AZIONE COLLATERALE ANCHE CONTRO LA BOLLA DEL PESCO E MONILIA)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (CADUTA PETALI-SCAMICIATURA)

AFIDI

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE, TERMINATA LA FASE DI FIORITURA, CON PRODOTTI A BASE DI:

IMIDACLOPRID* (CONFIDOR) (EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO)

ACETAMIPRID* (EPIK)

OPPURE

THIAMETOXAM* (ACTARA)

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

(*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ)

MONILIA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

DIFENOCONAZOLO(SCORE 25 EC, ETC..)(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

PROPICONAZOLO (OPINION, ETC..) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

(PER I P.A. IBE AL MASSIMO 4 TRATTAMENTI COMPLESSIVAMENTE)

OPPURE

CYPRODINIL (CHORUS)*

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)*

(*MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO COMPLESSIVAMENTE)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (BOTTONI ROSA-FIORITURA)

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO D'INFEZIONE ED IN QUELLI COLPITI DAL PATOGENO NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ENTRO LA FASE DI PRE-FIORITURA CON UN PRODOTTO ANTIOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI) (IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

TICCHIOLATURA

VISTA LA FASE FENOLOGICA DI RECETTIVITÀ VERSO IL PATOGENO, IN PREVISIONE DI PIOGGE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI:

DODINA (VARI) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO)

OPPURE

PROPINEB (VARI) (MASSIMO 2 TRATTAMENTI/ANNO ENTRO CADUTA PETALI)

OPPURE

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.) (COMPLESSIVAMENTE AL MASSIMO 12 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)

PERO (FIORITURA-CADUTA PETALI)

TICCHIOLATURA

VEDI INDICAZIONI PER IL MELO

SI RICORDA CHE IN FASE DI FIORITURA I TRATTAMENTI SONO CONSENTITI SOLAMENTE A SEGUITO DI DEROGA REGIONALE





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PERO

(FIORITURA-CADUTA PETALI)

TENTREDINE/AFIDE GRIGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE, TERMINATA LA FASE DI FIORITURA, CON PRODOTTI A BASE DI:

IMIDACLOPRID* (CONFIDOR) (EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO)

ACETAMIPRID* (EPIK)

OPPURE

THIAMETOXAM* (ACTARA)

(*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ)

CILIEGIO

(FIORITURA-CADUTA PETALI)

MONILIA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR)

OPPURE

PROPICONAZOLO (OPINION, ETC..)

(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO SU CILIEGIO)

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)

(MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO)

CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

TIRAM (VARI)(AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO ENTRO LA FASE DI SCAMICIATURA)





Coldiretti Alessandria



CILIEGIO (FIORITURA-CADUTA PETALI)

AFIDE NERO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE, TERMINATA LA FASE DI FIORITURA, CON PRODOTTI A BASE DI:

IMIDACLOPRID* (CONFIDOR) (EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO)

ACETAMIPRID* (EPIK)

OPPURE

THIAMETOXAM* (ACTARA)

OPPURE

PIRIMOR* (VARI)

(*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO)

SUSINO (FINE FIORITURA)

AFIDI/TENTREDINE

IN SITUAZIONI A RISCHIO PER PRESENZA DI DANNI NELLE PASSATE STAGIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE, A FIORITURA ULTIMATA, CON PRODOTTI A BASE DI:

IMIDACLOPRID (CONFIDOR, ecc..)

AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO

EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO.

MONILIA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

PROPICONAZOLO (OPINION, etc..) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

CYPRODINIL (CHORUS)*

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)*

(*COMPLESSIVAM MAX 1 INTERV/ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ)





Coldiretti Alessandria



SUSINO (FINE FIORITURA)

CORINEO

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI AD INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:
TIRAM (VARI)(AL MASSIMO 2 INTERVENTI, MAX 1 IN CASO DI UTILIZZO DI ZIRAM).

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

